

**DISSERTAZIONI
MEDICO
CHIRURGICO
PRATICHE
ESTRATTE...**

DISSERTAZIONI

MEDICO - CHIRURGICO - PRATICHE

ESTRAITE DALLI ATTI

DELLA R. I. ACCADEMIA GIOSEFFINA.

E TRADOTTE

AL Dr. *LUIGI CARENZ*,

COLLE AGGIUNTA DI ALCUNE NOTE.



F. P.

VIENNA, 1799.

PERSE LA SOCIETÀ TIPOGRAFICA.

4.8

AL SIG. DON GIOVANNI ALESSANDRO

DE BRAMBILLA

CAVALIERE DEL S. R. I.

TENENTARIO DI CASPIANO

DOCTORE DI CHIRURGIA

CONSIGLIERE CIVICO, E PRIMO CHIRURGO

DI S. S. C. A. M.

G I V S E P P E H.

PRIMO - CHIRURGO DELLE R. I. ARMATE

ISPETTORE

DI TUTTI GLI SPEDALI DELL' AUSTRIA

PRESIDENTE

DELLO STESSO MEDICO CHIRURGICO

DELL' ACCADEMIA GIUSEPPINA EG.

MEMBRO

DELL' ACCAD. DELLE SCIENZE DI BOLOGNA

MANTOVA E FIRENZE

SOCIO

DELLA E ACCAD. DI CHIRURGIA DI PARIGI

DEL COLLEGIO CHIRURGICO DI MONTPELLIER

E MEMBRO ONORARIO

DELLA E ACCADEMIA DELLE ARTI LIBERALI

DI VIENNA

Illustrissimo Signore

Dedicarsi ciò, che è la maggior parte
Vostro, non mi farebbe peccato di Voi un
merito, se io per una parte non avessi
che quella mira, e Voi per l'altra non
aveste per passion prediletta i vantaggi del
Pubblico. La Traduzione delle Vostre
Dissertazioni, quali con altre poche ar-
disco inviare ai Torchi, non può servire
a farmi aspirare ad un grado maggiore
di quella Protezione e Benevolenza, di
cui per animarmi alla Vostra sublime car-
riera mi onorate, se non in quanto che
moltiplicando io, e facilitando così i me-
zi di Illuminare, e dirigere sempre più
colle produzioni del Vostro spirito i tanti
dc.

deposuati dell' altrui sanità e vita, contribuissi nel modo a me fattibile all' oggetto Vostro premuroso di giovare all' umanità. Come il tradurre un' Opera è la via più sicura di meglio possederla, io faceva mio profitto occuparmene. Veramente a fare rispettiva giustizia così all' originale, che al Traduttore altra miglior penna vi si sarebbe richiesta: ma piacquero alla Graziosità Vostra di concedermela prerogativa ad un Ammiratore Vostro fischiodino (*), il quale spinto dalla fama del Vostro nome ha impresso a seguirvi, abbandonando il suo natio per trovare presso di Voi più giovevoli nella scienza d'Esculapio, e d'Ippocrate i documenti. Ed io vedo tanto fastoso della distinzione, che mi avete in adesso usata, quanto lo andate Voi de' luminosi contras-

(*) Il Traduttore è nato in Paris, dove ora stabilisce il Giornale, quale Professore Primario di Medicina Pratica di quella celebre Università, di cui il nome Bandello è tanto notoramente benemerito.

traffegri di firma procuratociela dalla magnanimità del sì Augusto Imperatore Nostro di gloriosa memoria per lo zelo della Vostra assistenza nelle crisi di sua preziosa salute alla cura Vostra affidata (*). Io deggio pertanto protestarmi più carico d'obligazioni per questo titolo verso di Voi: pure ad esse quest' altra importantissima aggiungerassi, che vogliate cioè graziose in questa mia scarsa fatica l'impressione di renderla rispettabile col fregiarla del Vostro Nome. Ne sarà più liano il ora in avanti, che sul mio esempio gli inglesi alla cura dell' altrui salute abbandonando l'Italia per trasferirsi alla Capitale della Germania. Lo stabilimento dell' Accademia Medico-Chirurgica per' Vostri consigli e spinte non meno, che co' Vostri lumi, ed opera da Cesare inteso.

(*) E' noto anche per li fatti pubblici con questa circostanza abbia Giuseppe II. contraddistinto nello scorso Settembre il merito de' Professori, che lo hanno assistito, e particolarmente quello del Rege Cavaliere.

tutta, anzi le medaglie fosse ad eterna memoria d'un Epoca all' umanità, ed al nome Vostro si presiede coniate (*) coll' autenticamente all' aspetto la realtà, accender ne debbono (come in me accadde) un nobil ardore di ritrovarsi a portata di profittare d'una istituzione sì interessante. Quanto a me deggio attellare, che giovani effettivamente vidi esser la cosa deg.

(*) Nella raccolta de' Medagliani di questo Sign. se ne distinguono specialmente due con quello tipo, l'uno in argento, e l'altro in oro del peso di 50 Zecchini, quali preferibilmente ad ogni altro, gli dona il Sovrano col complimento veramente degno da imprimerli a caratteri d'oro. E' giusto che voi ne abbiate le prime. Chiunque è porta a vedere la di lui bella collezione di quadri, stampe, ed Antichità, troverà come egli abbia messo a profitto anche i pochi momenti solerti alle sue gravi occupazioni, e studi anche per la coltivazione delle belle Arti. Questo è un fiuto di più, perchè varj benefici ne abbiano a gara voluto sterpare la memoria nella di lui effigie.

degna della pubblica aspettazione, come della mente, e del cuore, con cui ne immaginale, e ne concepisse il progetto. Se m' avanzai nella scienza Medico-Chirurgica, io l'ottenni proficacemente nel frequentare per lo spazio di quasi due anni il letto degli ammalati in compagnia di quegli illustri Professori; l'ottenni dalle altissime anatomiche preparazioni, e dai solidi ingegni dell' arte in scelta non meno, che abbondevole copia così raccolti. Lascierò da parte il far menzione de' molteplici strumenti d'ogni maniera opportunissimi all' arte, de' scholarii, delle figure internamente, ed esternamente organizzate a maggiore schiarimento dell' Anatomia, de' mostruosi, e naturali parti, e de' terribili effetti de' morbi in particolari guise rilevati. Mi atterrò soltanto a quella parte, che più direttamente riguarda l'origine di quella piccola ma letale per afflictarvi, che ne furono occasione i libri Vostri per ogni titolo eccellenti, che vi ritrovano in Germano, o Latino, o del nostro idioma

tradotti. Anzi dirò unicamente, che fra
gli altri tutti, gli Atti dell' Accademia
Latini, e Tedeschi, i quali contengono
osservazioni nuove, ed interessanti, e
quelle specialmente della dotto Vostra
penza sortite, mi recarono a fare la
Traduzione per quello stesso, che voi
ne creavate l'Autore di tanto plausibile
Stabilimento, come lo era stato dell'
Accademia Parigina il celebre nostro Ita-
liano *Lezfranchi*. Ho ardito di ancor al-
le vostre possille qualche osservazione,
quando il testo me la suggerì; ma pro-
sciendendo anche da quelle, io sono persua-
so di aver messo la mano a periti un'
Opera, che non tanto raccomandasi per
quello che è, come per il soggetto di cui
è parlo.

Credetela, e vivete lungo tempo sa-
no al bene, ed al lustro della Professione,
come alla compiacenza d'essere Voi gi-
unto tant' oltre nel conciliarvi la venera-
zione, e meritare la gratitudine del Pub-
blico.

Occupazione, ed assistenza

Secundum

Levi Coram.



DISSERTAZIONE I.

IN FINE

IL FUNGO DELL' ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO

PER

ESS. CAT. D. ALESSANDRO BRAMBILLA.

MDCCCXXXIII.

§ I.

Dei Tumori freddi.

Si è osservato costantemente che i tumori così detti di natura *fredda* nascono lentamente, e che nel tempo stesso sono difficilissimi ad essere guariti sia per la natura indole degli tumori che gli compungono, sia a ragione delle parti solide che sostengono i fluidi stagnanti, e finalmente per via d'ambiguità interna.

A

§ II.

§ 2.

Il fungo dell' articolazione non si deve confondere cogli altri tumori freddi.

Ve n'ha fra quelli una specie singolare, che suol occupar le articolazioni, ribelle all' ad ogni metodo di cura, e insieme pericolosissimo, che suol nascere all' articolazione del ginocchio, ed è un tumore fistoloso, che so chiamo *Fungo dell' articolazione*, di cui pochissimi, e confusamente hanno trattato; e moltissimi non ne fecero menzione alcuna. Questa malattia, per quanto consta dalle mie osservazioni non è congenita, né ereditaria, né affligge i fanciulli da latte. Trovasi più di frequente fra i Turchi, che nelle altre nazioni d'Europa; né so se debbasi incolpare il grand' uso de' cibi farinacei, e della biada, o piuttosto il clima. Fra le articolazioni che vanno soggette a questa malattia, i ginocchi vengono più frequentemente attaccati, che i cubiti, e le altre parti.

§ 3.

Idropisia dell' articolo impropriamente detta e l'anchilosi è un tumore opposto all' Idropisia.

Molti diedero a questa pericolosa malattia il nome di *Idropisia d'articolo*, creden-

do che la materia di cui formati si trovano il
contenuto nella stessa articolazione, cioè nel-
la capsula legamentosa del ginocchio. Ho
sparsi molti cadaveri morti d'asfite, e sin-
farea, e in tutte le parti del corpo ho ritro-
vato delle acque clivulose, eccetto nelle ar-
ticulazioni: anzi osservai spessissime volte af-
fusa qualche fessidissima: ciò vien confermato
dal croceo de' condili, o dell' anchilosi, che
di frequente occorrono nel decorso di tali
malattie. Non sono questi forse effetti del
tutto opposti a quelli dell' idropica? Noi
osserviamo tali effetti allorchando il moto,
come quello, pel di cui serve serbasi fluido
l'umor sinoviale, manca nel ginocchio da
molto tempo; per la qual cosa si condensa
talmente, che s'ispella, e talora diventa
osso. Sappiamo anche, che la sinovia non
per natura propria si cangia da fluida in so-
lida, ma tal mutazione si deve considerare
come un effetto proveniente dall' essenza
del moto necessario nel fluido. Quell' an-
chilosi rimane alcune volte anche dopo la
cura del tumore.

§ 3.

L'idropica non può essere che sistematica.

Può ancora facilmente arrivare, che
degli umori raccolti attorno la capsula lega-
mentosa, e formati com'è per l'acrimonia

A a

che

che hanno contratta nel loro flagellamento, e per la pressione dei vasi adiacenti, costringiti a calare dentro, si facci una effusione, e ne succede la carie nell' articolazione, pare quello non è altro, che un effetto del tumore preesistente esternamente nel ginocchio. Che se consideriamo attentamente la natura della sinovia separata dalle sue glande, facile è il concepire, che l'idravire non può aver alcun' altra particolare sede, che meriti d'esser chiamato *idropatico*, quindi che non gli convenga il nome di *tumor sinoviale*, impropriamente dato da alcuni Autori.

§ 4.

Il tumor sinoviale con carie è diverso dall' Idropisia.

Dato anche che questo *Fango* fosse prodotto da causa esterna o da qualche escoriazione, da cui ne nasce la carie alle effusioni degli ossi, e che corredi la stessa capsula ingrossata, ciò che al principio deve manifestarsi con dolor reumatico, quali non s'osservano nel *fango*, non per ciò si avrà un titolo di chiamarlo *Idropisia dell' articolato*. La ragione è che non può ivi trovarsi concorso, o insensamento di ferro, e supponendo ancora questo nelle parti essenti, sarebbe un' infermità non già *idropatica* ma *sal-*

salvato *fantomatico*, il che affai di rado potrebbe aver luogo. Se vi fossero leggi certi che indicassero la cattiva indole della *Sinovia*, cosicchè le cisti dei cordili fossero delle medesima qualità e corrotti, in questo caso non li dovrebbe dire *Idropigia* ma piuttosto *tumor sinoviale con cisti*.

§. 5.

L'Edema non ha da confondersi col fungo.

Non si scorge mai esser il *fungo dell' articolazione edematosa*, se non quando viene in seguito d'un edema, che dai piedi scende fino ai ginocchi, ma neppure quella sorta di tumore si deve confondere con quello di cui noi trattiamo.

§. 6.

I tumori follicolati differiscono d'affai dal fungo.

Si trovano ancora tumori *follicolati*, che appartengono alla classe dei *feutomi*, *ateceni*, *meliceridi*, e a quella degli *acquosi inflessi*, che hanno la lor sede sopra il ginocchio, e specialmente sopra la rotola. Ne ho trattati alcuni mescolati in enorme volume, mobili per altro, nati o da contusioni, o da lunghe grattellioni; a cui per questa ragione tra gli altri vanno soggetti i Religio-

li dell'ordine de' mendicanti, e le Monache separtatto, se sono assottimate ad avere a ginocchio nuda. Si curano questi tumori, se sono ancor recenti facilmente colla quiete, e coll' empastro detto dai Tedeschi *Caput-argyleus*, o sia offuscato. Ma quando il fistuolo s'è già formato, ed ha acquistata certa solidità, non è possibile di levarlo a meno, che non si passi all' amputazione, o alla suppurazione naturale, o artificiale. Eb- bi a curare alcuni tumori di quella natura er- siviati a segno di occupare tutto il ginoc- chio, e per guarirli i quali dovetti far passa- re il settone per mezzo alla loro sostanza. Rifarsi era dopo levando dal tumore tutto quelo di materia sterile a quella, che facil- mente risorgeva nell' estremità del corpo pedegro, ed undici circa d'indole calcare, e schacciare, e mediante la suppurazione ne ottieni il ri- stabilimento. Questa specie di tumori detta impropriamente dai Tedeschi *Gelenkschwan- nen* non si deve in conto alcuno confondere col fungo dell' articolazione.

§. 7.

I tumori delle articolazioni sono diversi.

Finalmente i tumori, che attaccano le articolazioni possono esser di diverso genere nella stessa guisa di quelli, che vengono nelle altre parti del corpo, ma questo, di cui noi

noi puderemo, è un tumore d'una specie particolare.

§ 8.

Il vero fungo dell' articolazione naja è poco a poco da una materia mucilaginosa.

Il vero fungo dell' articolazione occupa le parti che circondano, e coprono il ginocchio. Se è idiopatico cresce lentamente, se poi è sintomatico precepisce in un tratto. La materia che lo forma non è altro, che una linfa mucilaginosa, e glutinosa, che attaccandosi alle tendine, lamine della tunica cellulare, e fluendo in modo di gelatina invade i tendini, i legamenti, le sponevoli, e tutta la superficie della capsula stessa.

§ 9.

La vera sede del fungo e i sintomi del tumore esistente nella parte superiore del ginocchio.

La vera sede adunque di questo tumore è la stessa tunica cellulare, che copre le parti annessi all' articolazione del ginocchio. Questo tumore nella parte sua superiore s'innalza non di rado tra il muscolo retto, e il vasto tanto esterno, che interno. La di lui parte superiore è generalmente più larga, e di maggior volume. Se affligge specialmente la parte superiore tendinea del muscolo

retto, allora impedisce che il ginocchio possa piegarsi; di più se è una maggior forma per la flessione, facilmente il dolore si comunica perfino alla parte superiore del femore, infermandosi il tendine di questo muscolo nella tuberosità interna dell' osso illeo. Successivamente, secondo ciò che ho osservato, il tumore si estende più largamente sopra il muscolo retto, che sopra il vasto esterno, e sopra quello di più, che sul vasto interno. Alcune volte ho rimarcato esser sì forte la pressione del tumore laterale, che alzò la rotula, e la cacciò nella parte opposta. In tali circostanze trovai era affidato alla mia cura un giovane Principe nell' articolazione, e capsula illese, e l'ammalato gode dell' azione della articolazione, comunque alquanto incomodamente per quanto premette la rotula.

§. 10.

I sintomi del tumore sotto il ginocchio.

Al di sotto della patella il tumore è sempre minore, maggiore però sotto il poplite stesso: la loro cura per altro, se sono molli, generalmente non è difficoltosa, come si vedrà più abbasso. Qualche volte mi sono incontrato a vedere che il tumore della prima specie fosse tale, che avesse lesa gravemente il grosso nervo crurale, nè mai vidi, che dal tumore occupante quella par-

te effusa del ginocchio, per dove scorre il nervo ischiatico, siasi eccitato alcun dolore. Ma il tumore della seconda specie comprimendo i vasi, e gli nervi sottili, può facilmente produrre l'atrofia, e l'edema.

§. 11.

Forma degenerata del fango dell' articolazione.

Questo tumore non naturale per lo più, come si è già detto di sopra, si genera lentamente, è duro o molle, più o meno secondo la maggiore, o minore quantità di materia in esso concentrata; la di lui superficie è lissa, di colore o naturale, o pallido; il tumore è di natura sua indolente, specialmente se la parte affetta trovasi in quiete, e dale quando è grande e duro, ed anche in allora il dolore nasce soltanto nel moto, prodotto cioè dalla maggior estensione delle parti, che sono d'altronde assai tese, e compresse: Per lo più se havevi dolore, questo è profondo: compresso il tumore con un dito non vi rimane segno alcuno, come avviene nell' edema, per cui considerando la natura mi pare più convenientemente chiamarlo *fango d'articolazione*, come che compresso, si scorge esser a guisa di fango dotato d'elasticità, e se vien recisa la pelle, cresce evidentemente, e in poche ore o giorni, cancella irregolarmente con lacerazione delle lab-

bra della ferita, si difende in un fungo enorme rassomigliante ad un fungo. Se si avesse a fare una comparazione con qualche tumore elastico, e nella sua superficie avesse color naturale, ci potrebbe servir d'esempio una scrofola assai grande; imperciocchè se quella non è scrofola femminella l'idea di quella falsa formazione, che appare nel fungo dell' articolato; e forse non vi passa differenza se non in rispetto al luogo, alla sede, agli effetti.

§ 12.

Doppia è la specie del fungo dell' articolazione.

Vi sono adunque due sorta di tumori elastici o *fungi dell' articolazione*, molli, e duri: ambedue possono essere piccoli, grandi, semplici, composti, secondo la quantità, e qualità degli umori contenuti, e in ragione ancora delle parti contenute. Parliamo ora della prima specie.

§ 13.

Alla prima specie appartiene il tumor molle.

Questa abbraccia i tumori molli, e superficiali, che occupan soltanto la tunica cellulare e i legamenti della rotula; Delle per altro rimane mobile, come se galleggiasse sopra una massa fluida, abbenchè nella capsula legamentosa non vi si trovi raccolta

ab-

alcuna d'unione stravagante. Per facilitare il moto della rotula sembra concorrervi un pò di siero, che si allaccia all' unner lussativo frantumando i legamenti della rotula. Questi unner rilassando i sopradetti legamenti, e la pelle stessa, formano un tumore molle, pallido, senza dolore, quale sovente viene accompagnata da gran debolezza di corpo. Io penso almeno, che la mollezza di tal tumore non da altro dipenda, che dalla lassa stessa; mentre questa di natura sua non è densa, ma per la lunga rimessa, o per altre esterne ragioni, che vi concorrono, è obbligata soggiacere a tal cangiamento.

Quantunque per la precisione fatta non sembri il fluido lussativo contenuto nel tumore bastante esser denso, come accade in una vescica non del tutto ripiena; nè non essente se con un coltello si tagliano gli incapsamenti del tumore anche molissimo, non fortoso, che alcune gocce di sangue provenienti dall' lacerazione de' vasi esterni; sieno alcune altre di siero, ma ben poche, e quelle purissime, limpide come acqua, e di color giallognolo; la sostanza interna del tumore lasso rassomiglia ad un amaro spaccato in mezzo, o ad una gelatina, e che non impedisce, che il tumore possa esser compresso, onde è chiaro, che la sua mollezza dipende unicamente dal siero. Quindi è facile ancora concepire, che l'unner quasi flagellato non

trovati, come sembra, racchiuso in un sacco. Questo tumore è pallido, cedente alla pressione, ma non vi ritiene l'orma del dito impresso, la fluttuazione è falsa, e fallace; se è recente ampiezza guarigione specialmente ne' giovani.

§. 14.

Alla seconda specie appartiene il tumor duri.

La materia, che trovati eccitata nel tumore di questa prima specie pare di natura uguale alla saliva condensata sotto la lingua nella così detta *Spiegolide*. Nel tumor poi di seconda specie, la lesa veste l'indole di mite affetto alla crosta fragile del sangue; che essendo neghittoso, o con ritardi allungati, e spiritosi maltrattato, si condensa accumulandosi tra le lamine della tunica cellulare; e forma croste lamellate, e a guisa di finto soffritto insieme combaciato, quali si veggono nella parte interna dell' *anurysma vero*, come ho potuto osservare in molti cadaveri. Propelle le quali cose, non c'è poco come alcuni Autori abbiano paragonato questo tumore coll' *Idrocele*.

Il tumore della prima specie in qualche annusato può esser ancora periodico: in alcuni nasce dall' aria fredda, che accresce la coagulazione; in altri dall' umore caldo, che risolve i solidi, specialmente se questi trovati debilitati dalle antecedenti malattie. Cos-

sceluta la cagione della malattia, e dedot-
tane l'indicazione giusta, non è difficile
la cura.

§. 15.

Le cagioni del fango interne ed esterne.

Le cagioni del fango dell' articolazione
del ginocchio sono o interne, o esterne. Le
prime sono le più forti delle seconde, ap-
partenendo a quella classe la massa degli
umori viziosi, ovvero una materia, che,
per malattia preceduta acuta, o putrida, fa-
li per metastasi deposta a quelle parti.

§. 16.

*Si può soffocare ed una cagione esterna una
causa interna, e viceversa.*

Può darsi ancora, che colla cagione
esterna, che è la più frequente, si combini
l'interna, e viceversa che quella si congiun-
ga con questa, e quindi si aumenti il male.

§. 17.

La prima specie passa facilmente nell' altra.

Non di rado arriva, che la prima spe-
cie passa nella seconda, o nasce per negli-
genza dell' ammalato stesso, o per cattiva
medicazione, specialmente se si applicano
cose spirituose, aromatiche, o forti altre-
menti; mentre sotto l'uso di tali rimedi con-
stringendosi i vasi, la parte più fluida degli

umori

umori flagranti viene soffocata, e il calore della parte condensata può diventare irresolubile, e per le ragioni anzidette si segue l'ancidutà e la cura.

§. 18.

Le cagioni del fungo interno.

Tra le cause interne di questa malattia si devono annoverare lo scorbutto, la leucorrea, la gonagga, la sagra ritrosiflata sopra tutto ne' corpi cachectici, o flemmatici. Raramente nasce senza cagione manifesta. Può venire per altro questa malattia in seguito d'una febbre remittente, intermittente, o putrida; da forte emorragia, da disenteria o diarrea, che continui lungo tempo per 'il gran rilassamento cioè de' solidi, qual rilassamento però sembra più probabile, che da occlusione soltanto alla porta ipetica.

§. 19.

La Cura.

Se il tumore riconoscesse una delle quì accennate cause, si potrà facilmente ottenerne la cura coll' uso degli alimenti nutritivi, corroboranti, con un poco di vino, di costosa purviana, della linatura di ferro, ridonando cioè le forze al corpo, e insieme corroborando eternamente le parti affette. Ho preferito le acque minerali ancon con felice successo. Dove il rilassamento delle

libbre è eccessivo, e gli umori insulsi de-
vono abbondar di troppo, si può metter in
pratica principalmente gli diuretici, interpe-
damente gli Idroagoghi, alla fine passare
agli anaristici, e corroboranti, scioè i va-
li e le altre parti solide acquellino maggior
cristallità. Si devono evitare gli elassi, e
tutto quello che può levarne il ristellamento
della libbre.

E' necessario alcuni nei tumori di tal
forte, accompagnati da debolezza di corpo,
di star più in lungo l'uso dei corroboranti
al interno, che esterno, altrimenti è da tu-
mori, che non essendoli consolidati i lega-
menti della patella, i tendini e la stessa ca-
psula legamentosa, non vi rimanga una laci-
chezza del ginocchio particolare: per la qual
cosa non solo potrebbe cagionare difficoltà
nel camminare liberamente, ma ancora ad
un legger inconveniente produr di nuovo la
stessa malattia. Vi è a tal proposito una
salsa detta condensata destinata per l'arti-
colazione: ma quella non è sempre sufficien-
te; se ciò accade, si potranno adoprar i
bagni, o fomenti di vino fatti coll' erbe di
Lavanda, rosa, fiori d'or., o con i fiori
aromatici di rosmarino, camomilla, feni-
culo d'or.; i bagni minerali, postimenti e gli insuffi-
ci minerali; e quelli fatti col vino saranno an-
cora efficacissimi. Quelli ed altri simili rimedi,
che sono indicati in questa prima specie di

teriosi, si potevano praticare anche (allorchè però siano diventati molli) nei tumori di seconda qualità senza tema di nocimento. Degli altri medicamenti topici poi che convengono, parleremo a suo luogo, quando tratteremo della cura del tumore di seconda specie, che passa nella prima.

§ 30.

Osservazione di un fungo che appartiene alla prima specie.

Al principio dell' anno 1764. presi sotto alla mia cura il Sign. de Miller Officiál Maggiore Ispettore dell' Accademia militare con un fungo della prima specie nel ginocchio sinistro. Era un uomo di 63. anni di temperamento sanguigno-bilioso, per l' avanti sano. Essendo questo accostumato ad esercitarsi continuamente nelle fatiche militari, e in particolare nell' ultima guerra, tutto ad un tratto si diede all' ozio ed al riposo, per cui ne è venuto in seguito una debolezza di corpo, e quindi una deposizione d'umor linfatico nel ginocchio sinistro, che obbligò l'ammalato in pochi settimane a guardare il letto. Non volle mai far chiamare persona alcuna, attribuendo il suo male alla vecchiaja, e perciò credeva, che non potesse aver luogo alcuna cura. Alla fine dunque della continuazione di tale suo incomodo, chiese da me soccorso, v'andai, e

300

proprietà la ragione accidentale, prescissi dei fiamanti fatti con rosmarino, e cortecce peruviane cotti nel vino rosso, da ripetersi spesso volte: internamente ogni giorno mattina e sera doveva prendere una dramma di China col vino, alla notte s'applicavano sopra della parte alcuni sacchetti ripieni di fiori di samburo, di farina di segale con un poco di canfora, si doveva fare delle frizioni mattina e sera per tutto il corpo, acciò s'eccitasse un moto maggiore negli umori d'altrove lenti: la dieta era moderata, consistente in cibi adattati, e in un bicchier di vino generoso. Nella decanquiesima giornata cominciò ad alzarsi, e quindi nello spazio d'altro due settimane, continuando l'applicazione giornalmente due o tre volte dei sacchetti, si caldi, e ogni terzo giorno rinnovandoli, fu interamente guarito. Per scopo profilattico gli raccomandai la dieta, e un moderato esercizio di corpo, quindi facessi più piogoso di quello, che lo fosse per l'avanti, visse lungo tempo libero dal tratto da una tal malattia. Convien in tali infermità evitare l'eccessivo moto del corpo, non meno, che l'aria umida sì delle stanze, che del atmosfera principalmente vicina ai luoghi paludosi.

§. 21.

I vizj degli umori che accompagnano il fungo.

Se durante il tumore si osservassero gli umori crudi, o miasmi, da cui il corpo non si possa perfettamente liberare, in allora si dovrà aggiungere ai topici diredi gli interni atti a correggerli, e a scacciarli dal corpo.

§. 22.

Il tumor metastatico non si deve confondere col fungo.

Se il tumore è nato da metastasi, e inoltre la massa degli umori è contaminata, il che accresce la difficoltà della cura, non è improbabile, che in allora possi passare in suppurazione, quale difficilmente sarà buona, e perciò quello tumore si dovrà trattare come un ascesso. Finalmente questa specie di tumore non si deve confondere col fungo dell' articolazione, di cui parleremo, mentre non cresce sensibilmente, e a poco a poco, ma fuori d'ogni immaginazione predeterminata, e in poche ore, e quantunque presenti un colore pallido nella sua superficie, pure è accompagnato quello tumore da dolori ingrossi, o miasmi in agione dell' acrimonia, o quantità di materia vi raccolta, ed extravasata; da poi vi sopravvie-

re un'infiammazione superficiale, e in allora il tumore si distingue più agilmente dal fungo; la fluttuazione ancore non è fallace, ma in realtà presente, e manifesta.

Gli tumori metastatici che sopraggiungono a quelli, che sono attaccati dal vespere maligno, e che invadono l'articolazione del ginocchio, o del cubito, da principio manifestano quella specie di fungo, di cui testiamo, ma pochi giorni dopo si scoprono esser d'indole assai diversa, mentre crescono con gran forza, producono dolori, e cagionano facilmente la carne, per cui si deve aprire un tal tumore quanto prima, e con tutta celerità.

§ 13.

Frequentissime sono le cause esterne.

Le cause esterne del fungo sono frequentissime, per esempio la costuzione, l'altissima, una lussazione mal curata, o negletta, la traspirazione soppressa principalmente allor quando il corpo suda, e si espone in tale stato all'aria fredda.

Non di rado simili tumori occupan l'articolazione del ginocchio dopo una prececuta artrite vega, e ancora nel tempo, che questa trovasi presente, la quale per lo più è un effetto della traspirazione arrestata. Una costuzione sofferta alle parti esterne dell'articolazione, o altra lesa estetica possono

rompere i vasi linfatici, e siccome da una rottura de' vasi sanguigni nasce l'ecchimosi, così da quella de' vasi linfatici si formerà una fistolosa sotto la tonaca cellulare producendo un tumore linfatico pallido nella superficie, e di color naturale. Se i vasi linfatici verranno soltanto lesi, e l'umor extravasato rimanga fluido, ed sarà raccolto in molta copia, che possa esercitare qualche urto notevole nelle arterie e nervi, in allora il dolore diverrà appena sensibile; per lo contrario poi se saranno in gran quantità, attaccando le parti sensibili, ed irritabili nascerà un dolor gagliardo, anzi che se i nervi della peritone di tal maniera soffriranno un grado di stramento tale vicinissimo a rompersi, in allora potrà facilmente insorgere un' infiammazione topica, durante la quale l'economia animale sarà molto sconcertata, e ne seguirà la febbre.

§. 24.

Osservazione di un fungo della prima specie prodotto dalla caduta.

Nel tempo stesso, che scrivo questa Dissertazione, io in compagnia del mio fratello Antonio ho condotto a felice termine una cura di un simil fungo, di cui ne racconto la storia. Un nobile Signore d'anni 50. di alta statura, di corpo pingue, e robusto nel discendere le scale cadde sul giacchino de-

llo,

dro, nella cui parte nacque nella spazio di poche ore un gran tumore. Essendo stato brevemente perquisito da un Chicago di Città esservi sotto nervi e tendini, sorpreso da tanto grande ebbe a me ricorso. Eliminato diligentemente il tumore trovai esservi solo stravellimento di linfo. Il tumore era molle, e di color naturale; estendevasi a quattro dita sopra il ginocchio, e a sei dita geometriche superiormente alla rotula: questa era mobile come se soprastante a qualche fluido; l'ammalato in stato di quiete non soffriva dolori; provava però qualche piccola difficoltà se gli si comandava di piegare il ginocchio, per superar la quale faceva d'uso d'uno sforzo più forte, e sentiva qualche dolore nella parte superiore del legamento della rotula. Gli prescissi dell'unguento mercurio col quale doveva ungere il luogo dolente due volte al giorno; al tumore si applicava un fomento di vino diluito nell'acqua con fiori di samburo, rose, lavanda, edra di rosa, sotto l'uso del quale in due settimane giunsi l'indurimento a ricadde, rimanendoli soltanto una piccola macchia giallognola. Se invece avessi adoperato medicinali spiritosi più forti, consigliati dal sopracitato Chicago, non è incredibile, che questi gli cagionassero dolore, e infiammazione, o almeno il sangue della prima specie degenerasse in quello della seconda.

§. 15.

*Conversione di un fango dalla prima specie
Atto dell' aria fredda.*

Un altro caso è il seguente. Un Amico sortito dal bagno, vestito leggermente non s'era garantito a sufficienza il suo corpo; quindi si espone bruscamente all' aria fredda e ventosa; nel giorno seguente fu afflitto da dolori crampici vaghi, quelli portati in poco tempo ai ginocchi, quivi si depositarono, producendo un tumore grande in ambidue i ginocchi; questo era però molle, pallido, e indolente. Ordinai adunque all' ammalato di stare in letto, gli prescrissi ne' primi giorni alcuni cucchi di stiviera acquosa di Radabaro, e per promuovere la traspirazione un infuso d'erba Thé d'Olanda, ed eternamente doveva porre sopra il tumore un panno turchese imbevuto del succo d'arbutano; continuata in quell'atto per qualche tempo li restitui a letto, che dopo quindici giorni poté alzarsi liberamente di casa.

In tali malattie ho rimediato giovevole affettando gli fasciotti riempiti di fiori di sambuco ridotti in polvere, misti colla farina di segale, ed un poco di candore, e così caldi applicarli al tumore, rinnovandoli spesso fra la giornata. (*) §. 16.

(*) In tutte le sue opere abbiamo d'una guarigione d'un simile fango, condotta l'anno 1740 in quest' Ospedale.

§ 16.

*Altre affermazioni di un fungo cagionato
da soppressa respirazione.*

Ecco un altro esempio, da cui manifestamente si può dedurre, che i tumori nelle articolazioni dei ginocchi possono essere causati da materia reumatica? Il Sigr. Tenente K. entrato nell' estate dell' 1770. al numero delle Guardie Imperiali uomo di circa 30 anni assai magilento, e debole, poichè già da cinque anni consecutivi era molestato da un arttude vaga, e da tumori, che occupavano le articolazioni dei ginocchi, e dei cubiti. Al principio dell' autunno venivagli la malattia, e si cacciava per tutto l'inverno in guisa, che l'infermo non si poteva più alzare. Al comporre della primavera scomparivano i tumori, al tatto non soffriva alcun dolore; ne sentiva per altro al menomo moto nell' articolazione della gamba. Durante l'estate d'altro non ignorava, che d'una gran debolezza, come effetto di que' malori sopportati nell' inverno.

B 4

Ar.

Giuseppe Carlo di Vienna nel mese di febbrajo in una vesigia donna, la quale nel tempo delle affezioni di una febbre gallica, e poco dopo del medesimo tumore, per alcune parti degli annessi fuorchè di lombi e braccia di sopra, aggravavasi darsi la Gastera alla dote di una donna,

Avvicinandosi la rigida stagione dell' anno 1776., al cominciar del mese di novembre ritornò l'apiciale, e gonfiatisi ambedue i ginocchi fu costretto l'infermo a starsene in letto, afferendo che non vide mai il tumore cresciuto a tanto volume, ne è da suprirsi, se quelle parti ricadute in un soggetto di già debolo avellerò acquistata una tal distensione. Per imporre il corpo senza guastarlo gli diedi dell' acqua di sale amaro, e per aumentare la traspirazione del *Reo* di Sordano: gli consigliai nel tempo stesso una dieta elatta; ma tutto indarno, ingrossandosi ciò non ostante il tumore ogni giorno di più. Per la qual cosa gli feci una mistura composta d'ossimole e altro, e un decotto serrato di bardana, *salisparilla*, *China medicea*, e *gramigna*; feci applicare al tumori due sacchetti caldi di fiori di samburo, ridotti in polvere colla *farina di segale*, e un poco di *conserva*, da rinnovarsi spesso volte fra il giorno. Si adoperarono le sedente cose per 15 giorni inutilmente, mentre se il tumore più grande era nel ginocchio, e quivi venivan messi i sacchetti, dopo due, o quattro giorni scomparve il tumore, e si portava all' altro; se poi si ponevan quelli ad ambedue i ginocchi, li vedevan attaccati or uno, or l'altro subito, e qualche volta ambedue, e ricorrendo intanto se li collocavan i sacchetti al cubiti, i tumo-

ri invelavano di nero i ginocchi. Continuava l'uso de' fucchetti, e in luogo della misela, e decocto suppuratorio propoli l'infuso di *Contrajerva* e dei *flori di sambuco*; quali messi in uso per 12 giorni i tumori non diventavano minori, ma crescevano vieppiù. Il malato mediocrementemente coperto sudava, e il sudor freddo, che sapendo le voci di bagno su tutte le malattie reumatiche è di alleviamento, fu nel nostro infermo assai nocivo, mentre fatto il sudore ad ogni piccolissimo moto delle membra le articolazioni si facevano dolori.

§. 17.

Cura efficace di questo fungo.

Per la qual cosa abbandonati gli accennati rimedj passai all' uso della tartara acquisa di *Jua* barbare alla dose di due once; da repetirsi quattro volte al giorno e al decocto di cicoria da bevvere due bicchieri ogni mattina. Mi rifiell di prescrivere tali medicamenti, riflettendo che la cagione di questi tumori o doveva risiedere nel ventricolo, o almeno, deprivatali l'azione del medesimo, poteva il male essere sostenuto da una moderna, o vischiosità d'urteri. Nel primo giorno si sciolsi il corpo tre volte, indi una sol volta ne' di seguenti; s'applicava al tumore soltanto un panco di lana colorita coll' indaco trauppato del ferro aro-

mutino d'Olibano, benzoe, e succino, rinnovandolo spesso volte al giorno. Nel corso di pochi giorni del salutare l'infiammazione, e nello spazio di tre settimane ricuperò la salute. Avrà poi non rimedisse, credevi opportuno di fargli prendere delle pillole fatte d'etiope marziale, Cortecchia peruviana e Rabarbaro in poca quantità per dieci giorni continui mattina e sera al numero di sei. Poco dopo divenne sì pingue, che al comparir in pubblico a prima vista si appena avvisato dai suoi conoscenti, e quindi volle libero dal tumore che erasi della prima specie, da cui fu tanto tormentato per la qualità della materia peccante, e la di cui cura fino ad ora non può dirsi manifestata.

§. 28.

La prima e la seconda specie di fungo può esser composta, o complicata. Questo tumore può passare in un altro d'altra specie.

Tanto la prima, che la seconda specie del fungo dell' articolazione può esser composta, o complicata: chiamo composta se una porzione del fungo è molle, l'altra è dura; complicata poi se nel fungo vi sia già rossore, o dolore, oppure erosione della capsula, de' legamenti, e carie &c. Se nel tumor testaceo il rossore, che può esser prodotto da diverse cagioni, dai fomenti

lib. II

stessi ancora, dalle frizioni adoperate alcune volte in tali tumori, trovai congiunto, e quantunque quella le frizioni non si disegui, ma ostinatamente fallisse, in allora questo luogo sarà complicato, e può facilmente degenerar in altra specie, cioè del tumore caldo, e qui, se verranno occupate soltanto le parti esterne, si avrà luogo a sperare una buona suppurazione, benché questa arrivi di rado, e una tale speranza sia più incerta della risoluzione.

Se questa suppurazione non trae origine dalla carne, si potrà ottenere un ottimo esito di buona salute, purché venga trattata come si richiede; dobbiamo però guardarci, (il che desidero si raccomandato a tutti i Chirurghi) dall' eccitare il tumore col colle frizioni fredde, che col medicamenti irritanti, o rubefacienti; ed si attribuerà a un severo sforzo di natura l'infiammazione, che verrà in seguito, o la suppurazione resistita con violenza, la quale se abbraccia soltanto gli integumenti, sarà inutile; se penetra poi più profondamente, potrà attaccar le viste parti sane, senza recare alla malattia principale il menomo sollievo.

L. 19.

Observation di un fungo peduto in un tumore infiammatorio, e seguita la separazione felicemente curata.

Nell' anno 1766. una Signora nata di nobil famiglia d'anni 40. circa, d'ottima costituzione soffrì pazientemente per alcuni mesi un fungo d'arteriazione della prima specie, che la negligenza. Accresciuto il tumore alla grandezza di occupare tutto il ginocchio, e alla fine costretta dal male mandò a chiedere soccorso. Le consigliai di starne a letto, e gli ordinai una dieta conveniente e un legger porgente di una dramma delle pillole armoniacali del Quercetano da prendersi ogni cinque o sei giorni; inoltre del lachetti ripieni di *ferri* *sa di fare*, d'erba *glivano* ridotte in poltore, unitamente al *ferri di rosi* con un pochetto di Giusfara, quali dovevano applicarsi al tumore caldi, e rinnovarli soventi volte. Nello spazio di tre settimane il fungo sgonfiò a segno, che sembrava vicinissimo alla totale guarigione; Ma lamentandosi di nuovo la Sign. d'un dolore al di sotto del pollice, staccasi la parte, e vi scopersi un tumore mobile della grandezza d'un picciol ovo, di color tendente al rosso, e dopo tre giorni già livido, come nell' antenar. Messavi l'emplastro *diachylon*, in pochi giorni pas-

passò il tumore in suppurazione, fu di col-
fatta un incisione forte della materia simile
alla medicea; e adoperò l'unguento dige-
stivo di temestina, e l'annullata nel 13.
giorno guarì perfettamente.

§. 30.

Simile tumore guarito colla suppurazione.

M'accadde osservare lo stesso in un ragaz-
zo di otto anni, che portava al ginocchio
un tumore della medesima natura. Coll'
uso dell' empastro di galieno e sapon di
Fenczia sciolto nell'acqua, e chiodo pesto
sulla parte affetta, ogni volta che questo
veniva per bisogno rinnovato, fatto il tu-
mor più molle andava a poco diminuendo.
Dopo dieci settimane nella parte posteriore
vicino al poplite comparve un tumore in-
fiammatorio niente diverso da un gran fu-
roncolo, la di cui rottura chiedeva sì anche
nella parte laterale del fango, quale termi-
nò in pochissimo tempo in un ascesso della
grandezza d'un ovo, che tagliato medical-
coll'unguento basilicono; ma vedendo in
seguito, che il fondo dell'ulcera si faceva
bolante, aggiunsi al suddetto unguento un
poco di mercurio precipitato rosso; quindi
la suppurazione divenne migliore, e pochi
giorni dopo spuntava dal fondo, rosso di co-
lor rossiggiante, una carne lodabile. Questo
tumore sguarì in ragione della suppu-
ra-

zione a poco a poco cedeva, e dopo un'otturazione dell' lesione fatta il regno rimase interamente.

Simili sforzi di benefica natura sono affai rari; almeno a me (benche abbia io avuto un gran numero di ammalati di tal forte) non toccò di vedere casi uguali, che nelle due citate volte, dove li ottinno la guarigione per mezzo di tal suppurazione, la quale, se non fosse stata procurata dalla natura in un luogo più lontano, ma nel corpo stesso del tumore, non so se del pari felice ne sarebbe stato l'esito della cura nei due riferiti casi. Per la qual cosa se un tumore tale non è metastasico, in ogni maniera il Chirurgò deve aver di mira d'evitare la risoluzione.

Così siano i tumori scrofolosi degli Inglese?

V'è chi veramente sostiene due regioni del luogo d'articolazione, che è stato trattato dal medesimo (*), una è scrofola, l'altra reumatica. Di quest' ultima se n'è già parlato di sopra; è vero, che la materia scrofola può produrre un fungo d'indole pessima, e quantunque questa preda di noi non s'incontri comunemente, giova però la.

(*) *Requiem dell' Dilettazione sopra i tumori, e loro cura con delle note sui tumori glandulari delle articolazioni* pag. 121. 122. e 123.

sipere, che le ferofole così chiamate dagli inglesi, sono una malattia in quel paese assai frequente, e propria alla nazione stessa. Queste in alcuni corpi umani quando si morifoltano, sembrano imitare il cancro cosiddetto benigno; alle volte guariscono, ma vanno ad investire di poi altre parti del corpo: sono ereditarie come la podagra, attaccando or tutta la famiglia, ora soltanto qualche discendente della medefima. Ometto di parlare di tal fotta di ferofole, imperocchè farebbe lungo il fare la defcrizione.

§ 31.

Le ferofole da noi conofciute.

Alle ferofole da noi conofciute non vanno foggette, che le glandole fotto mafcolari, e le parotidi, non meno che le conglomerate, e le conglomerate; e comechè tutti i corpi tanto leucodermatici, e cachectici, fono difposti a contrarre le ferofole, così ancora non è da negarli poter i medefimi foggacciare a fuggi d'articolazione. Nei veriani quefta fpecie di tumori ferofolici con un laumento compolto di bile bolliva, fal comune, ed olio di Socer, di cui ne tratta il Profeflore Stroot nella fua difertazione nello fteffo tomo *Acta Academiæ*, aggiungendovi, fe fa bifogno per ufo interno, le pillole difoppilative di gommæ arab.

mo-

monica, efratto d' *Rob' arbor*, e *Sapon* uncto. Con felce succello posimenti si adopera qualche volta il medesimo linimento nel fango delle articolazioni di prima specie. Ma le vesciole degli inglesi essendo di natura diversa dalle nostre, non si sono fin ad ora potute trarre dal loro corpo.

§ 33

Il fango della seconda specie è difficile da curarsi.

Dal fin qui detto ne risulta, che il fango dell' articolazione della prima specie fa facile a curarsi; da ciò poi che diremo in appresso si dimostrerà, che è di gran lunga più grande la difficoltà di guarire il fango d' articolazione spettante alla seconda specie, cioè quando è duro, e nato lentamente. Questo è resistente, più profondo, di color pallido, con una superficie assai liscia. Se la sua diffusione è sì grande, che occupi la parte inferiore, e la superiore del ginocchio, o ambidue; in allora scbben più di rado, occupa l' articolazione del spalluolo, del cubito, e del corpo. Se è semplice poi, specialmente al di sotto della rotola del ginocchio nella parte inferiore, al di cui legamento s'appoggia lateralmente, in allora è di minor volume, e non tanto difficile a curarsi, quanto lo è allorchando trovasi nella parte

superiore; ciò non ostante sfugge tutta l'attenzione del Chirurgo sopra tutto ne' soggetti cachectici, e leucosternmatici: Imperocchè in questi casi se non si mette riparo per tempo è facile il veder crescere il tumore continuamente, e rendendosi ribelle ai medicamenti, farsi del tutto incurabile.

§. 34.
La Prognosi.

Dal linearis procedesi, e dal preseniti, non meno che dai rimedi applicati si formerà la prognosi. Se il tumore è inveterato, e appartiene alla seconda specie, si fu trascurato, o mal trattato co' rimedi spiritosi, ed allringenti, per cui sia nata non solo una gonfiatura di lassa, ma anche una rigidità ai tendini dei muscoli estensori, e flessori; allora si farà un cattivo prognostico, benchè il tumore sia semplice, che se in principio, cessando dopo di continuo è divenuto complicato.

In questo caso primariamente il moto dell' articolazione del ginocchio viene impedito, imperocchè la sinovia si è a poco a poco condensata a segno che ha prodotta l'anchilosi imperfetta, o perfetta, di cui la prima allontana il libero moto dell' articolazione, la seconda la leva del tutto; essendosi le estremità del femore, e della tibia si costantemente connesse che hanno formato un

sol ossa, ed alla volte è osservato, che una la fibola si è franguta con la due succinate ossa, come si può vedere nella memorata collezione degli ossi morbofi, che possiede questa *Regio-Cajanus Mexico-Cajanus Academia*.

La seconda legge giudicando le vane curare il fuoco varicole per la eccessiva effusione del tumore; si eccita ancora il dolore, e la parte della gamba inferiore si rende atrofica.

§. 35.

L'amputazione del membro non è sempre sicura.

Tercio. Gli umori ancochè ottusi flaguando lungo tempo, costringono un arimonia, per cui il tumore infetto passa in vero carcinoma, e i tumori, la capsula, e gli ossi stessi vengono erosi (*). Che se la carne è nei cordoli degli ossi, l'estremità della gamba, che fu anticamente atrofica, ora s'è edematosa, e vi si allaccia la febbre lenta. Questo male alla fine resistendo ostinatamente ai medicamenti più forti diventa in-

(*) Si legge l'osservazione della parte II dell' opera del Solistodaguer alla pag. 178, il cui titolo, Trattato Chirurgico Pratico sopra il Cancro con Milano 1777. In molti luoghi si legge dell' amputazione del membro dopo la caduta, il quale, tumore col sangue dell'arto, passa in suppurazione, e quindi ne viene la legge la cura dei cordoli, e la morte.

incurabile; se altro vi rimase che l'amputazione della parte, quale non è sempre un'operazione sicura, poichè in circostanze simili di sommo grado, dove per lo più le forze mancano, l'ammalato non può reggere ai dolori, alla febbre, alla suppurazione, il che non si può impedire in un amputazione d'un membro di tal natura come è la gamba. Si aggiunga, che gli ammalati quantunque al principio dotati di buona complessione, lungamente però tormentati dal male, vanno a finire in cachectia.

Per la qual cosa, quando l'esperto Chirurgo capisce non aver più a sperare cosa alcuna dai rimedi, non opera da imprudente proponendo o ai malati stessi, o a loro parenti la necessità dell'amputazione da farsi nella parte sana in tempo, avanti cioè che le forze si debilitino. Suppliamo per troppo quanto sia difficile il persuadere all' infermo, o agli assistenti, che si sottomettono ad un'operazione sì dolorosa; come del pari sappiamo quanto convenga piuttosto perdere un membro, che la vita stessa miseramente, facendo inutili sforzi per conservarla.

§. 38.

Del tumore inciso segua la morte.

La vera cagione di è ancora incognita, pure è certissimo, che se si apre un tal tumore o peccia, e tardi ne vien di seguito la

morte inevitabile. Per il che i Chirurghi dovevano ben esser quasi dal tempo Reputati, e venghian indotti da quella felice specie di Istruzione, e dalle sciolte persuasioni degl' ignoranti. Il mio Maestro Sign. Grasseil il più onesto, ed esperto Prof. e Primario dello Spedal di Paris spessissime volte ci raccomandava di non mai aprire i tumori fistolici, quantunque la tosta non si separasse il perchè ciò succede, pure è certo l'eventuale pericolo di morte: tenai sempre nell'animo profondamente impressi i saggi consigli di questo grand' uomo, e fuor di un caso solo, dove per le importune replicate preghiere d'un soldato infermo fui costretto di aprire il tumore con un alto fistale, al di cui sopravvivere mi trovai tutt'ora pentito.

§. 37.

La morte di un soldato dopo l'incisione del tumore.

Nell' inverno dell' anno 1762. nello Spedal militare del Reggimento Lofky, nel quale in allora io era Chirurgo maggiore, trovavasi a letto da due mesi l'anzidetto Soldato. Entrato nello Spedale era nel seguente stato: Tutta la parte superiore del gravocchio rimaneva attaccata da un tumore assai grande, duro, resistente, che si estendeva al di sotto della tosta; il movimento dell'an-

Assoluzione era interamente interdetta. Aveva l'età d'anni 30 circa, di costituzione di corpo molto robusta. Non potai scoprire alcuna regione di quella malattia; asseriva l'istintato d'esser già la settima settimana, da che il tumore aveva cominciato, e che di giorno in giorno cresceva maggiormente. Si ardevano per alcune settimane le frangie coll'aceto *marcato*, e sopra tutto ogni mattina e sera per menz'ora. E siccome da un folto, e gialastro color della faccia, come ancora dalle gengive livide si arguimontava esservi nel sangue un'acrimonia febbrile, fu stabilita una dieta di vieto conveniente, proibendo cioè le cose feroci, se non fermentate, dandogli que' cibi soli, che somministrano le erbe delle radici di tal luogo, concedendogli ancora un po' di vino a pranzo. Con questo metodo fu ridotto il tumore alla grossezza d'un pomo grande comune, risiedendo nella parte interna del ginocchio, non molto duro, il quale, secondo il solito, aveva una specie di flaccidione follice.

M'accorsi finalmente ad aprire quel tumore, fissato dalle replicate continue preghiere, spualmente non sapendo colla mi promettevole la virtù dei suppuranti, e degli elatetici per disingrossar facilmente la carne fungosa, la quale prevedeva assai bene dover nascere dal tumore. Fatta adunque un'

incisione per il lungo del tumore di due pollici circa, comparve una massa di carne simile alla polpa dell' amaro tagliato in mezzo: non uscì dalla ferita, che alcune gocce di sangue dei vasi cutanei. Nella giornata seguente il loro resto, i pannolini bagnati d'un poco di siero, ma il tumore s'era dilatato di più, e più duro, l'ulcera però lardacea, quale non depurandosi sotto l'uso dell'unguento balsamico applicato per tre giorni, vi aggiunsi al medesimo un po' di precipitato rosso, e tutta la superficie del tumore veniva coperta con l'emplastro di Galieno crociata. La piaga difetti cominciò a divenir rossa, ma rendersi ancora fungosa senza poter mai ottenere una vera suppurazione. Applicai dei Trochisci formati di precipitato rosso coll' allume abbruciato, e colla gomma arabica, e ridotti in forma di sottili pastelle corrispondente alla figura dell'ulcera. Quantunque l'ulcera d'indole sarà dopo il primo, e secondo giorno sotto custodia, ed incessante somministrazione di nuovo altra carne fungosa, e il tumore accresciuto di molto passo in infiammazione. Quindi estende nel settimo giorno dopo il taglio del tumore sopravvenuta insieme la febbre, abbandonati i primi rimedi, mi diedi tutto ad altro metodo di cura; anzi cioè la ferita coll'unguento digestivo semplice di romarica, e r'imporsi al tumore un cataplasma fitto di

di mollica di pane, latte e aceto; internamente gli ordinai una mistura antilogistica, e lo spirito di vitriolo dolce diluito nell'acqua la guaià, che nello spazio di 24 ore doveva prenderne una dramma. Ma anche questo fu provato indarno, e il tumore, e la carne singola crescevano di continuo, sebbene la febbre di staccarsi, finchè la morte nel ventiduesimo secondo giorno dopo l'incisione del tumore non potesse terminare al male.

§ 38.

L'effetto dei caustici.

Una sol volta in questa specie di tumori mi casò vantaggiosa l'applicazione del Saponodan Trachitis, nè è da meravigliarsi, tanto che in allora il tumore era situato non già nell'articolazione del ginocchio, e de' legami legamenti, ma al di sotto del ginocchio nella parte anteriore della tibia, quindi del tutto trattabile co' caustici; le ne diedi la descrizione alla fine di questa Dissertazione.

§ 39.

Osservazione II.

Fui invitato a vedere l'operazione d'una vera idropisia dell'articolazione (come il Chirurgo stesso la chiamava) del ginocchio. Un tumore dei più grandi, e dei più molli,

ch'io m'abbia veduto, attaccava il ginocchio d'una povera donna di 55 anni circa. Al dir della medesima era già il festino mese della malattia, nè poter sospirare cagione alcuna. Esortavo che ella diligentemente guardasse quel tumore con ragione le più forti, e di gran momento cercai di persuadere il Chirurgo a non credere, che fosse una vera Idropisia, ma indarno, afferendo egli costantemente, che almeno vi dovevan esser raccolte dodici libbre di siero; dimandò adunque un vaso assai grande; ed essendogliene stato presentato un piccolo, che appena poteva contenere l'ottava parte del richiedo, insidendosi il Chirurgo operatore laguava- si, perchè non gli avrebbe portato un vaso grande: io risposi, (trovandomi presente), che lo era anche di troppo, ma quello uomo fido nella sua opinione s'accalse all'opera, e con un ago triestipitale aprì il tumore, ma non sortì una goccia dell'umore supposto: dopo due giorni fece due altre incisioni profonde e lunghe due pollici per richiamar lo siero, e non ottenne, che poche gocce di sangue, e di siero. Nel giorno seguente si scoprì il tumore pieno di macchie in parte livide, e in parte variegate, e di Eliceni, il fondo della ferita si riempì di gelatina condensata, e lucida. Dal che sorpreso il Chirurgo s'affrettò a mandar l'ammalata nello

Spe-

Spedale Univerſale, dove dopo pochi giorni morì.

§. 40.

Oſſervazione III.

Il medefimo Chirurgo conſigliato da un Medico fece un taglio profondo in un luogo dell' articolazione del ginocchio della ſeconda ſpecie ad un ſervidore di circa 40 anni, a cui ſoppravvenne lo ſtaccello, e in poco ſpazio di tempo la morte, come l'operatore Chirurgo ſteſſo raccontò a chi tra ſcelle un tale accidente.

§. 41.

Oſſervazione IV.

E' morto nel 14. giorno un Medico ſecreto, che lo ſarvelli indarno, di guarderſi dall' incuſione di ſimil temore; e di cui incomoda d'altronde era ſopportabile, mentre ne eccedeva in grandezza, nè impediva che ben poco la ſellione del ginocchio, potendo altrui ſpeditamente curarſi; e quello ſuccellò in grazia di voler liberarſi da un' anclideſi profonſa incompleta, prodotta in parte da alcuni cataplaſmi di pane, ed elirato di Saturno.

§. 42.

Oſſervazione V.

In eguale maniera un Sacerdote robuſto, uopo d'età avanzata provò nel quin-

to giunse gli effetti fatali della operazione eseguita nel fango dell' articolazione del ginocchio, contro il mio consiglio. Da una vasta costuzione nasceva origine quel tumore, e da sette mesi si trattava con sforzi inutili; nel primo giorno dopo l'operazione fu allato l'inferno dalla febbre, che insorse nel termine di cinque giorni e così fin gli ultimi periodi della sua vita.

§ 45.

Osservazione VI.

Una donna ebbe a soffrire nel ginocchio destro una leggier contusione; pochi giorni appresso si gonfiò la parte superiore del ginocchio: si misero alla prova i rimedi dimessi d'oggi intora, ma senza frutto, finchè finalmente cedendo il tumore, nello spazio di sei mesi occupando coll' enorme sua mole le parti del ginocchio anteriori, e laterali, perdette la donna l'uso interamente del moto del piede. Egli era molle, e indolente; aveva la superficie di color pallido; la parte del ginocchio posteriore rimase libera dal tumore, ma il piede diventò per stizza così assaiunto, che gli integumenti comuni sembravano corrugati, ed eran degenerati in color giallognolo. Per cinque settimane si trattò in uso per ordine del Chirurgo i vapori formati di decotto d'erbe balsamici, a cui aggiungevasi un po-

co di fide anatomico, e certa. Non avendo alla fine potuto ritrovare altro rimedio più efficace, credendo manifesta la formazione del tumore, e che esistesse qualche materia fluida; si è indotto il Chirurgo, che aveva preso in sua cura la donna, a far un incisione sopra il tumore lunga tre pollici, dalla quale non sciolse ne sangue, ne alcuna altra materia. Sulla speranza d'ottenere la suppurazione si fece uscir in pratica i suppuranti, i fomenti risolventi, e alla fine gli irritanti; ma inutilmente d'affaticò per il lungo tempo di 18 settimane, anzi che diventava la donna sempre più in uno stato peggiore. Inconcedendosi l'assistenza al dottore propose l'amputazione, supplicò il Chirurgo, che piuttosto gli ordinasse qualche rimedio, acciò il male non s'aggravasse, e per mezzo del quale potesse mitigare i dolori del resto, che si sarebbe curato da se stessa, e così all'ultimo abbandonata, verso la fine del decimo mese dell' incominciata malattia, passò agli stessi riposi.

§. 44

Osservazione VII.

Il Maestro di Tamburini del Reggimento Thürohm nell' anno 1777 fu sorpreso da un' ulcera dell' articolazione della prima spina, che occupava tutta l' articolazione del cubito destro, principalmente nella parte
 po-

posteriore. Interrogato se sapesse la cagione della malattia non seppe accennarne altra, che d'esserli di troppo lacerato il braccio nell'aver dato forti colpi di bastone, e d'esserli perciò sentito un dolore nel medesimo cubito, quale sparì sotto l'uso de' fomenti fatti d'acque risolventi, e continuato per tre settimane; quindi risaltò di se ne parti. Dopo un anno intero ritornò allo Spedale con un tumore al cubito stesso, in cui si scoprì una apertura della grandezza d'una moneta d'argento (chiamata dai Tedeschi *Siebenscher*) effetto della cura perverosamente tentata da un Barbiere di un certo villaggio, che prometteadogli sicura guarigione con semenza ardere sopra questo tumore, e di poi fatta una forte pressione, così riferiva l'ammalato, fece uscire un pò di gelatina di colore, e consistenza simile alla polpa d'arancia. Aperto il tumore fu medicato dal Sign. *Kraus* Chirurgo militare, applicandovi del fumo di sapponi, e risolventi, come aveva praticato prima nel tumore del cubito medesimo; ma nella giovinezza: una febbre lenta afflì l'infermo, si adoperò la corteggia Peruviana in gran dose ma senza successo, e nello spazio di poche settimane, la morte fu il segnale della temerità di un uomo inesperto, qual fu il suo Operatore.

Osservazione VIII.

Un marito, che alloggiava nel sobborgo di notte tempo venne scoperto da un improvvisa mania, e fuggendo voleva andare a precipitarsi in un fiume; desiderando la moglie di ritenerlo dall' infusa impetosa, balzò incontinenti dal letto, e lo inseguì nel tempo, che correva; offendole finalmente caduto d'acchiarlo, cadde sul ginocchio destro. Oppressa la povera donna dal timore, e dal dispiacere, che le suggeriva la considerazione dell' accidente occorso al marito siccome, non seppe por mente alla gestazione, e dolose anzi nel ginocchio. Passò la settimana, comparve nel luogo costato un tumore molle, e quantunque ogni giorno crebbe, e le produceva un incomodo grave a camminare, pure l'inferma non cercò soccorso alcuno, né tralasciò di affaticare il piede ammalato ancor per due mesi. Dopo di qual tempo aumentandosi il male si obbligò al letto. Fanno ricompare un Chicago della Città le ordinò di applicare cose emollienti, quindi il tumore crescendo continuamente acquistò tal volume, che si dovette annoverare fra il numero dei tumori più grandi di questo genere; egli era indolente, ma se qualche uso lo premeva for-

temente, e mossa con qualche forza la gamba, in allora cessava il dolore.

In questo stato infermico della donna fu chiamato un Chirurgo maggiore del Reggimento Lobkowitz, che operato da una certa qual specie di furiosazione fece un' incisione ben grande nella parte laterale del tumore, collo scopo cioè di dar cifo alla gran quantità di sangue, che d'altronde per la loro dimora, e rifugio s'accumulava, non potessero esultare, e distruggere tutte le parti vicine. Ma intanto, e soprattutto, non solamente non volle uscire materia alcuna, ma osservò esser la parte del tumore tagliato, rassomigliante ad un melancancio spucato per nequa, e abbenchè comprimeva a tutta palla il tumore da lui diretto, pure non pote far uscire la menoma goccia d'umore di sorta alcuna. Veniva la piaga trattata col dovuto, cioè salutare, miscelato col succo di rose; al tumore poi si applicavano i fomenti d'erbe risolvitive. Nel quarto giorno sopraggiunse una terribile infiammazione per tutto il tumore, accompagnata da febbre, quindi ne seguì una suppurazione non già delle parti interne ma solo degli integumenti. Raccolse il Chirurgo alla corteccia Peruviana, ma intanto, poichè nella terza settimana dopo l'incisione fatta dovette l'infiammazione s'acquistare.

§ 46.

Cosa si debba raccogliere da queste osservazioni?

All' indicazione curatoria non solo ha-
ba l'uso dei rimedi convenienti, ma in pri-
mo luogo li deve allontanare tutto ciò, che
può esser nocivo. Molto da questi motivi
ho avuto molti esempi di cure infelici, e ne
avevi potuto accennare moltissimi altri, se
concessi, che questi pochi non bastassero per
rendere avvertiti gli Chirurghi di riguardar-
gli, come documenti necessari per essere
sicuro cuasi prima di risolverli all' apertura
del tumore di tale qualità. Del resto sarà
sufficiente di avere per norma, che il taglio
di questi tumori è fatale, malgrado non pos-
siamo addurre una ragione soddisfacente a
spiegare il che, ed il come questo avvenga.

§ 47.

*Uso del setacci e dei caustici perimenti
interni.*

Vi fu chi pensava di poter far passare
un setaccio pel tumore, sperando di evitare
così quel sistema, di cui abbiamo parlato, e
di procurare in tal maniera agli emulsi
del follicolo. Ma dall' effetto poi, che non
corrispose alla speranza li conchiuse, che la
cura era egualmente infelice, che quella del
taglio e dall' ago puntorio e non meno in-
felice.

felice fu la cura del caullio attuale e palpitante. Fuori per altro (come ha già detto above) adoparare utilmente il setone nei tumori follicolari, abbenche grandi.

§. 48.

Gli Anafoti.

Alcuni sogliono in questa malattia, non meno che nelle altre croniche proporre unguenti, emplastri ecc., come stimolanti ipocritici, per cui attenti i poveri infermi della vana lingua di guarire, aridamente gli abbandonano, finche all'ultimo vanno a perire. Lo stesso accade del pari a coloro, che per fatale disgrazia avendo un certissimo non seguono il consiglio d'una saggia operazione (quando questa fosse fatta in tempo) alla fine troppo tardi accostandosi all'operazione in quale non può aver luogo senza esporre la fama del Chirurgo.

§. 49.

Il fungo nato da cagioni interne si deve trattare con una cura interna.

Quando il tumor fungoso riva generato dagli umori interni per qualche vizio congenito, o da altre cagioni, altrove addotte, e introdotti nel corpo, in allora sono necessari gli rimedi interni atti a distruggere la causa produttrice l'infiammazione, quella che la alimenta, e ciò che può impedire la guarigione: non si debbono malamente i medicam-

ment-

menti topici, che son dotati d'una virtù efficace contro il male, da cui vien attaccata la parte del corpo, ma si debbiono combinare prudentemente cogli interni; altrimenti non si otturrà effetto alcuno, e la cura procederà con gran lentezza.

Bisogna adunque che il Chirurgo si ricordi, che se anche dopo la cura della lue venerea, e dello scorbutto, vi rimane tutta via della materia coagulata nell' articolazione, e vi ruscisse un male topico sia per indole propria della materia morbida, sia per il troppo ristamento, o rigida de' solidi, fa d'uopo, dilli, ricordarli, che non si può stracciar quella malattia se non co' moderatamente potentissimi succedimenti ed efficacemente applicati.

§. 50.

La cura del fango nato dalla rogna.

Se il tumore vien prodotto da una febre ritoccata, converranno i bagni ammollienti per tutto il corpo, e finalmente i medicamenti detergenti, antiscorbutici, il sale coll' antimonio, colla canfora, coll' Rosb di Sanlucio: se con queste cose poi non si può richiama la roga alla cute si farà dormie l' infermo con un altro reggelo nel medesimo letto se è contento, e lo potrà far commodamente, se no, gli si farà portare indollo per qualche tempo la cura

cia d'uno scabioso, e se questo pure displice-
celle, o non si potesse fare, si applicherà un
vesicante al tumore, e questo sarà l'unico ca-
so, in cui convenga tale rimedio per ri-
vòcare intinamente, e almeno in qualche
parte questa materia.

§ 51.

La cura del fungo nato dalla gonagra.

Se il tumore sarà nato da precedente
gonagra, cessato il parafimo, si tumori
come male topico, ed' risolvendosi cioè se
appartiene il fungo alla prima specie; se al-
la seconda poi cogli ammalheria, e alla ter-
za difformità; altrimenti l'umor indotto
potrà renderli denso, e degenerare in una
massa solida callosa.

Il tumor della prima specie è facilmen-
te suscettibile di cura, come abbiamo di so-
pra veduto, nè, quando proviene da causa
esterna, ha bisogno di rimedi interni. Com-
plicato però che sia questo tumor con la
carie, non può esser guarito con nessun al-
tro rimedio, fuorchè coll' amputazione del-
la gamba, se non è contraindicata come si
è già detto.

Il fungo della seconda specie, benchè
tuttavia non ricada la gangrena, ciò non
ostante dà molto fastidio al Curante, si nell'
impedire la cura facetta, o l'anchitoli, co-
me nel ribasare il fungo stesso. Ciò che e-
ssa

difficile di ottenere non solo per la cattiva qualità degli umori in flagranti, che per le parti ancora, che concorrono a formare il ginocchio, come sono i legamenti, i tendini, le aponeurosi, la capsula &c.

§ 58.

La cura interna del fango della seconda specie.

Tra le ragioni interne di questa malattia deve esser in primo luogo notata come la più frequente la cattiva digestione; quindi la cura interna sarà sempre diretta ad erigere le forze cadute del ventricolo, e a far cessar le impurità del medesimo. Serviranno ottimamente ad ambedue queste indicazioni il *Maharbaro*, o il *Dorato di radice di cicoria*, e *tarassaco*, coll'aggiunta d'un qualche *sale neutro*, come *Acervo d'opulento*, o *sale mirabile di Glauber*, *podicefio*, *omero*; acciò così non venga per mezzo di molte deiezioni debilitato di troppo l'umoralato; purgate poi le prime strade, converrà dare questi sali in più parti dello stesso scopo solo di tener lubrico il corpo. Si potrà continuare per qualche settimana, o anche mese l'uso d'un tale, o simile deontico, aumentando, diminuendo, o tralasciando secondo le circostanze il *sale neutro*. Nel pleurico sarà d'uso la curata di lingua, e spesso se sarà necessario, giovani molli

D 2

no

mo il fieno di sorta tamarindinata; si len-
cosimpomatici poi, e si melanconici li prescri-
verà un brodo tepido, o le pillole fatte
con elettro di piante amaricanti, radice
di Rabarbaro, Gomma ammoniaca, e sa-
poni.

§ 33.

La cura dietetica.

L'altro felice della cura sta nella prima,
o seconda specie di sangue dipende non solo
dalla virtù de' rimedj, che sono messi in pra-
tica, quanto da un leggiu' allontanamento
delle cagioni, che possono produrre, ed
esacerbare tali malattie, come anche da una
dieta scelta degli alimenti; la quale tanto
più, qui deve esser considerata indispensabi-
le, quanto che, i malati di tal sorta, tro-
vandosi nel tallo fasi, sogliono mangiar avi-
damente, per digerir i quali cibi sono pri-
vi del necessario esercizio di corpo, e da ciò
si manifesta l'altro motivo, per qual ragione
debbono loro di poi prescrivere un leggiu
purgante. Debbono in conseguenza questi
infermi evitare la troppa quantità de' cibi,
benchè di facile digestione. Quelli poi di
difficile digestione, e che contengono il tan-
gue, come sono i farinacei non fermentati,
pingui, oleosi, i legumi, e le carni salate
specialmente di porco etc. devono esser al-
lontanamente proibiti. Si concedano le carni
di

di vitello, di pollastro, o colombo colla salsa d'aceto, o col sugo di limone: le radici e le erbe secche, come la radice di scorzonera, finocchio, carotta, rape &c.; le erbe d'estiva, lattuca, spinacci &c. somministrano un alimento salubre. Per bevanda si può permettere il sugo di limone, melarancia, cedro dilato nell'acqua. Ai bevitori accostumati si potrà loro dare qualche poco di vino leggero, o birra, con meno che a quelli di foga rinfatta. Dove essent del tutto incedente l'uso di liquori spiritosi, dei vini generosi, e birra forte come sono vati. Sul finire della cura sono ottime le acque minerali marziali per corroborare le fibre muscolari, e per rendere la linfa più fluida.

§ 54.

Quali cose inoltre si devono evitare?

Si devono altresì scardine l'eccessivo fumo, l'aria umida particolarmente paludosa, e tutto ciò, che debilita le forze del corpo, come le passioni d'animo, il coito basso, e sopra tutto quella fatale inclinazione del tumore, come accennai di sopra. Lo stesso dicasi circa alla lunga quiete della gamba affetta, la qual parte di corpo infermiccio, benchè s'elga per lo più riposo, pare in questa malattia si deve procurare il movimento dell'articolazione a fine d'impedire una perfetta, e

imperfetta anch'ioff, d'altronde inevitabile, e una maggior densità di linfa sanguigna; ma questo moto deve esser moderato in guisa, che corrisponda sempre alla gravità e pericolo del morbo presente, e non sciti innanzi alcuna nociva alla parte. Che se per la violenza della malattia non potesse l'infiammazione fare alcun moto, in allora si potranno soffrire le frizioni, e di quando in quando sarà necessario muover leggermente il ginocchio.

§. 35.

La cura esterna del flegma.

Passa ora alla cura esterna di questo flegma. Le frizioni fatte leggermente fatte con pannolini di tela o di lana fina ci presentano un rimedio topico assai semplice, per mezzo del quale aumentando la forza delle fibre muscolari, e stringendo la lisa sanguigna, questo solo basta a dissipare la flogosità del tumore, qual ora sia recente. Giovano ancora le frizioni col solo sapone di Venusia, vi si può aggiungere ancor l'unguento mercurio, restituito matina e sera, e continuato per mezz'ora, coprendo di poi la parte affetta con un panno oleato, dato di lino, o di lana. Se il tumore può alla fine si fa molle, si aggiungano allo stesso unguento alcune gocce di spirito di rosmarino, o vino camforato. I rimedi adunque

inc-

raccomandati nella prima specie di fungo potranno essere utili ancora nella seconda, allorché il tumore per l'umore duro, ha già acquistata una conveniente mollezza, ma però con maggior cautela. E' da notarsi poi, che spessissimo facil matarsi la natura del tumore ora dura ed ora molle. Se ciò arriva si dovranno altresì cangiare i rimedi. Quando poi compare il desiderato effetto dei rimedi adoperati, non si avrà ricorso ad altri, che potrebbero essere di nocumento, ma attenerli soltanto ai medesimi.

Se il tumore è vecchio, e duro; se quella durezza è oriunda da' rimedi spiritosi, o spessissimi antecedentemente applicati, e si conosce esser la loda di già condensata, le allora convergono i cataplasmi ammollanti fatti d'erbe ammollanti seche, o recenti. Sono efficacissimi ancora i vapori formati co' decocti delle medesime erbe nell'acqua e latte. Colle suddette erbe seche ridotte in polvere, e coll' aggiunta o della farina di segale, frumento, orzo, o fave gatte nell'acqua e latte, o colla mollica di pane, latte, e orzo si facciano dei cataplasmi, quali avvolti in un pà di tela si applicano caldi, e non troppo umidi, e si devono rinnovare spesso due al giorno, cioè ogni qual volta perdino il calore. Qualora essi producano ancora l'aumento d'ulcera, e l'esse di verbigli con un poco di

spontanea. Se malgrado al continuo uso di questi rimedi non si dissipa il tumor sanguigno, si possono allacciare, agli arpidetti rimedi ammollienti altri più efficaci della classe de' risolventi, per cui venga ad attenuarsi la lesa flagante, e densa. I risolventi adunque hanno soltanto luogo quando la lesa coi rimedi accennati sia di già dissolta, e dissipata alla risoluzione.

Se si osserva esservi l'anchilosi, che accompagna necessariamente il sangue dell' aneurisazione, qualunque sia imperfetta, si dà ricorsi però co' stessi medicamenti fermentare tutta l'articolazione per ammollire, e rilassare le fibre muscolari, i vasi, i legamenti, e la capsula; anzi nasce la prima elasticità, e si mitighi il dolore prodotto dalla tensione di queste parti. Nella prima specie di sangue poi dove le aneurisate parti per il troppo rilassamento divennero atone, gli ammollienti non furono indicati, ma bensì i rimedi del tutto opposti.

Sovvente ho ritrovato la durezza di questo tumore tanto ribelle, che dovetti aver ricorso o al bagno fatto con vapori d'erbe ammollienti, o a una specie di embrocatione per mezzo d'una macchina inventata a tal uso, con una lamina sotto che ne mantenga vivo il bollor dell'acqua, e con una bocca che raccoglie i detti vapori, quali si determinano alla parte affetta. Quando non

Si poteva avere la suddetta macchina, munita alla sommità d'un vaso quasi ripieno d'acqua bollente un imbuto fornito d'un tubo lungo in figura di cono convergente, che colla sua base coprisse esattamente l'apertura del vaso, e coll' orificio del piccol tubo riguardasse il tumore, sotto del quale egualmente che colla macchina si posava una lampada. Questo bagno durava una mezz'ora, ed anche un'ora intera, mattina e sera secondo il bisogno.

Risolti molle il tumore v'applicò o i suddetti rimedi risolventi, o l'emplastro aspiccroso, o di guallano crocato, o l'emplastro di sapone del Barbette, o di diabolico, o di labdano, o quello del Figuee col mercurio. Se credesi necessario avvelenare di più la forza medica di questi emplastri, vi si aggiunge della trementina, dell'olibano, succino, mirra, e spirito di corno di cervo. E' utile ancora la Gomma ammoniacale schiata nell'aceto di vino, e ridotta in forma d'emplastro. Non fimo superfluo avvertire, che sotto l'uso di tali emplastri la parte affetta si eleva, e quindi spontaneo delle effluenze simili alle ustioni molto incomode si, ma che in pochi giorni svaniscono unitamente al tumore. Allora conviene alienarli dagli emplastri, finchè il loro interamente dissipati. L'indole poi del tumore presente si instruisce, se il debban di nuove applicazioni

questi impiastri composti, o gli altri più semplici.

Se il tumore non è interamente indurito, ma soltanto lo sia in una piccola parte, o quello luogo apertamente si collocherà l'orifizio del sovversorato piccol tubo, affinchè i vapori ascendenti si depenghino in questa parte, e acciò non si dissipino; dovrà coprire il tumore con un panno. Il resto del medesimo viene dato e lascerà coperto coi predetti impiastri. Terminato il bagno fa di malien nettare tutta la parte affetta, e fomentarla con un panno di lino, o di lana riscaldata, e annerato del fumo aromatico di maggior, o d'olliano, o di succino. Alcune volte non senza qualche ottimo effetto, specialmente ne' Poveri, ho fatto delle frizioni semplici mattina, e sera per mezz' ora con del sapon di Venezia, e di poi applicai al tumore un impiastro *glicerico*.

Quando tutto il tumore era ridotto ad una durezza mollezza ordinai il seguente fomento.

R^a Spirito di Sale Ammoniacale drac. due

Auto di vino quanto basta ad una perfetta soluzione; di poi si aggiunga

Acque di fiori di Sarcocoe onc. vii.

Se l'effetto di questo non corrisponde all'aspettazione, si potrà sempre il seguente rimedio, che provai oltre modo più efficace. Si metta in un forno assai caldo una tegola, cila.

olla coppe, ovvero una pignatta di terra non inverniciata, prima ridotta in polvere finissima; sopra di questa appena sortita dal forno, vi si versi dell' aceto di vino semplice, indi se ne faccia una pasta dell' grossezza d'un dito, e calda si applichi alla parte malata, si rinnovi almeno due volte al giorno. Qui debbo avvertire, che se dopo due o tre giorni non si ottiene il desiderato effetto, si desista assolutamente dall' uso di tal rimedio, e si ritorni agli altri più sicuri. La quale cautela dovrà esser presa anche sotto l'uso degli altri rimedi allungati. Disapprovo di sopra tutti i rimedi spiritosi, e allungati, ma si deve intendere soltanto del loro abuso, sì per ciò che riguarda la qualità, come per la dose. Lo che non senza gran cautela si dovrà praticare solamente nel tumori molli.

Vi sono alcuni, che sogliono far uso de' rimedi sturnici. Io ho osservato, che hanno questi fatto più male, che bene. Cautello però, che il sangue sotto longanimità nell' olo, o nel grasso di modo che diventando abbruciato non solo mi rischì innocuo, ma lo trovai ancora salubre. Quindi con illecito mi sono servito del seguente emplice (*).

R.

(*) Non è compenso facendo la regola dell' arte; applicarlo però alla parte offesa non nuoce, ma produce pena.

R^a. Sugo di carota recente unc. ij
 Butiro recent. non salato
 Midollo d'ossa di bue aa unc. ij
 Letargio dram. ʒ

Si facci cuocere a lento fuoco, mescolando continuamente, finche ogni cosa diventi netta; di poi si aggiunga

Candora dram. ij

Cera bianca quanto badi, sciolta
 si facci un empialco da applicarsi al tumore,
 e da rinnovarsi ogni due giorni, o anche più
 presto, secondo che più o meno verrà ha-
 grato dall' vapor volatile. Quando
 le fosse fatto depresso, e esistesse un rial-
 zamento di forza, e il tumore è molle, ag-
 giungo all'empialco suddetto due scrupoli di
 polvere di zinnabaro, ed uno scrupolo di
 polvere di carigoli. Del resto conviene con-
 sultare non esser tanto facile la guarigione di
 questa malattia: ella ricerca un uomo, che
 abbì tanta esperienza, e capacità, che sub-
 to s'avvegga se si debba insistere nel rimedio
 applicato una volta, o si debba abbandonar-
 lo, e ricorrere ad un altro; non parte della
 necessità d'esser fornito di certa qual posien-
 za, achè non si disturbino operando con
 troppa esultanza gli sforzi della natura: Que-
 sta malattia non soffre violenza di sorta al-
 cuna.

§. 56.

Difficoltà I. di un fango complicato curato per risoluzione.

Nell' anno 1784. una certa nobile Signa-
Q. nella seconda notte di febbrajo ver-
so le 12 ore serali, che una persona impor-
tuna batteva alla porta alla disperata; nel
balzo, che fece dal letto per cogliere alla
porta l'autore del tracollo, percò una fiorta
nel ginocchio destro, la quale percò, come
tollerabile ch'ella era, poco curò; anzi usò
per tre giorni consecutivi con pochissimo in-
comodo. Trovandosi una sera in Teatro,
ebbe il dolore nel ginocchio in guisa, che
l'ammalata dovette esser trasportata a casa
in lettiga, e guardare il letto. Nel giorno
seguinte fu assalita dalla febbre, la quale
passò in pochi giorni in putride. Dopo tre
se settimane finalmente si ebbe l'intermitten-
za, ma si lagnava col suo medico di avere
al ginocchio una contrazione, e tiramento,
e di soffrire ogni qual volta discendeva il
ginocchio gran dolore, e in allora soltanto
cominciò a raccontare la disgrazia, che le
era accaduta nel ginocchio avanti la febbre.
Il Medico credendo esser conseguenza della
febbre, disse, che la Signora poteva sicu-
ramente alzarsi dal letto: infatti si levò in quel
giorno stesso; ma il piede del tutto inca-
paci a passeggiare, siccome un palmo più
lento.

brevi dell' altro, e il dolore nel ginocchio intollerabile obbligavalo la notte a rimettersi ben presto al letto. I rimedi prescritti dal suo Medico, e usati per 15 giorni non operavano.

Per la qual cosa mi fece pregare, insieme anche dal suo Medico di prenderla in cura, e da me diligentemente esaminata mi raccontò l'origine del male, e come venne in tutto il tempo della febbre il piede non già doluto, ma bensì pregato, mentre povero per cipementa, che in tale posizione pativa minor dolore. Un tumor alla gamba, e due occupava la parte superiore del ginocchio principalmente al lato interno, che allora; in forma era un vero *fungo dell' articolazione di seconda specie*; la gamba insieme col piede s'era tutta atrofica: i tendini del flessor sotto il pollice erano contratti, e a guisa d'altrettante corde duri, e tesi: dall' insensibile movimento dell' articolazione del ginocchio compariva chiaramente esservi un *anchilosi imperfetta*.

Ordinai dei vapori fatti col decotto d'erbe ammollanti cotte coll' acqua, e latte da applicarsi per un ora alla parte affetta sotto il poplite, e quindi di ungere il luogo stesso coll' unguento d'altea, e coll' olio di verbasco: sopra il tumore poi del ginocchio, dove si trovava più elevato, e duro coll' seguente servizio, e sopra di Venesia do-

verrà fregare sempre mattina e sera per mezz'ora. Sotto l'uso continuo di questi rimedi si è ottenuto, che in tre settimane avendo i tendini acquistata la loro mollesza naturale, l'infirmità non solo poteva già flettere il piede a terra, ma ancora un poco passeggiare nella stanza; quindi il callo dei vapori, dall'unguento d'olea, e dall'elce di verbasco fin ora applicato al poplite, e il medicare il solo tumore, ch'ella pur ora deturco minore, e più molle, coll'unguento servivò ancor per 18 giorni, nel qual tempo veggendo diminuito in grandezza, e durata il tumore, tralasciò del pari l'unguento, e cessò applicarvi un empastro ossiccato coll'albume da rinnovarsi ogni quarto giorno; e così nello spazio di 13 settimane l'infirmità ritornò allo stato di prima, e guarì perfettamente.

§ 17.

Osservazione II. di un fungo della seconda specie guarito coi risolutivi.

Fu ricruta nello Spedale la moglie d'un soldato con un fungo della seconda specie di tanta grandezza, che copriva tutta l'articolazione del ginocchio sinistro. Da lei medesima riferiva l'infirmità esser principata questo grandissimo tumore, non adducendo altra ragione che di avere sostenuta, certa quel fango per tre giorni in ginocchio. Quan-

tun-

tunque quella giovin donna fosse gravida di sette mesi, e di fibra, nella cistida alla miglior piovra incominciò la cura della curra di sangue, che fu effusa circa a oncia; da poi il adoperaron i fomenti risolventi d'erbe d'artemisia, origano, lavanda, menta melle in un liscivello, e come nell'acqua; quando il tumore era già diventato molle, aggiunti a questo stesso fomento in poca quantità del sale ammoniacale, e dell'aceto di vino: nello spazio di quattro settimane disparsi tutto il tumore, rimanendo soltanto nel ginocchio una debolezza, la quale fu tolta per mezzo dell'impialastro officinale in 12 giorni, e la donna recuperò interamente la sua salute.

§ 58.

Osservazione III. continuando la storia di quattro tumori inguinali nel medesimo corpo.

Omneffe tutte le altre numerose osservazioni di questo genere, basterà riportar le seguenti per corona dell'opera, come quelle di maggior momento, e più complicate. Un Giovane principe del più alto rango d'anni 20 di temperamento sanguigno - bilioso, di mediocre statura, di corpo sia dalla natura età naturalmente pingue, e di fibra blanda nel suo viaggio, che fece di due anni nell' 1773 fu soggetto sovente al gonfiamento

riente de' piedi stato del resto, e della concessione della carrozza, e ogni qualvolta ciò accadeva, per mezzo del notturno riposo facilmente disgonfiavano i piedi. Verso la fine del suo viaggio trovandosi un giorno a cavallo, improvvisamente cadde col medesimo, e lesi una costola e in ambedue i ginocchi, che gli cagionò del dolore per alcuni giorni, quale cosa non avendo di troppo, ne lasciò la cura alla natura. Rilasciando in seguito il corpo co' movimenti troppo forti, incominciaron a dolergli non solo i ginocchi, ma ancora a diventar tumida quali anconodi venivan levati con il riposo e le frizioni fatte collo spirito di vino Camforato.

§ 59

Febre continua recidivente.

Nell' anno 1778 partì per l'armata (era in allora soldato), dove per tutto il tempo della guerra, cavalcando giorno e notte s'affaticò secondo il bisogno; spesso volte oppresso dalla carenza de' cibi ben preparati, e privo del tempo di potersi riposar, era costretto di quando in quando nutrirsi di pane nero unto di latiro; del resto era ghiotto per cibi farinacci e grassi, ed era affranto.

Nel giorno 29 agosto fu afflitto da un freddo, che durò per mezz'ora, indi fu seguito da una febbre continua remittente. Questa sotto l'uso del decotto di cicoria, tamarisco, e del polverello nella sera giunse a fare intermittente, e nella decima dopo un leggier parossismo terminò senz' altro rimedio. Fu costretto ad abbandonarlo nelle mani di un Medico, qualche miglia dietro l'armata, a cui proposi di dare all' infermo un poco d'estratto di china, e un poco di vino Tokai dopo il pranzo, il che non fu eseguito.

§ 6a.

Morto nero d'Ipocrate.

Al 13. di Settembre di mattina essendo prestate le vertigini due volte nello spazio d'un ora, cadde in una sineope, e pensò non avera appunto: il polso è era fatto intermittente, le forze debilitate, indi continuò un tremore sotto la cartilagine calciforme, e si propagò per tutto il lungo dell' osso femore. Per supremo comando dovetti immediatamente ritornar dal suddetto con ordine di non abbandonarlo se non guarito. Nella seguente mattina ebbe spontaneamente due scurche di corpo, fetide assai di puro sangue grassevole, e verso il mezzodì due altre

di nuovo finiti alla polsa con dei grani di sangue nero. Il Medico credeva che sangue emorroidale; prova il contrario, poiché sulla vena alle emorroidi, ed il sangue grumoso misto con elementi proveniva veniva dalle parti più lontane. La cagione di questo sangue evacuato per fecella, non essendovi stata piottura, se provenendo da uto tutto si valse, era chiaro che doveva derivare dai vasi ristretti che avevano spinto il sangue, o nel ventricolo, o nel tubo intestinale (*). Per lo spazio di due giorni gli feci prendere due cucchiai di tintura di Rhabarbaro quattro volte al giorno; nell' terzo giorno non si scopriva sangue stesso negli escrementi. De poi gli cedui una mistura di cortecchia peruviana per 12 giorni, tanto per affievolirmi della febbre, benché questa fosse leggera, e non avesse durato che due giorni, quanto per corroborare tutto il corpo e quei piccoli vascelli, che lasciano fluire il sangue o nel ventricolo o nel tubo intestinale.

§ 61.

(*) Van-Swieten Comment. XXVI. de Sina. de feb. et
tert. Sed dicit de feb. et tert. de feb. et tert. de feb. et tert.
propter diffundentis fluida, de feb. et tert. de feb. et tert.

§ 61.

Tumor dello scroto.

Nel giorno dopo che franarono gli accessi febbrili, si legò l'ammalato d'un dolore soporvenutogli nel delfo testicolare, esaminando la parte lo trovai in un con lo scroto più grosso per lo meno di tre quarte parti del sinistro. Coll' ajuto del sospensorio, colla quiete, e per mezzo dei fomenti d'acqua di rose distillata, e con alcune gocce di spirito di rosmarino, disgonfiò lo scroto ed il testicolo in pochi giorni. Liberatosi l' infermo da quelli mali al principiar d'Ottobre ritornò alla Patria, a cui pagna di partire, a fine di preservarsi dalla recidiva, raccomandò un esatta dieta, e l'uso della coartecina peruviana da continuarsi. Fu consigliato ad abbandonar dopo pochi giorni la China, e la dieta, ed a vivere lentamente, per cui pati di spesso delle indigestioni, dolori allo stomaco, vomito e diarrea, a cui però aveva contribuito il Medico sotto pretesto di darle e farla e nutrimento ed invocar de' cardiaci e corroboranti fu obbligato a prendere spesso fin il giorno un decocto ammolliente di radice d'Altea, e bardana (*).

§ 62.

Intervento chirurgico.

(*) Van-Swieten Comment. XXV. *Palidus hinc cum replicat experimento, dum reliquias restit-*

Un tumor dello fredo nato di nuovo.

Appena arrivato in patria gli si gonfiò di nuovo lo fredo, a cui forse ancor le scelle della carogna gli contribuirono, benchè avella tenuto il l'ospedaria. Si ripigliò il metodo di prima, cioè a dir i fomenti risolventi offerrando una miglior regola di vivere, e si astinva solo di carni tenere e di erbe. Il tumor si sciolse sì, ma più tosti che nella prima guarigione.

Eran già passati più di due mesi, avanti che mi fosse data l'occasione di vedere il Nobilissimo infermo, mentre egli trovavasi da me molto dilatato. Essendo io ritornato dall'armata in Città, nel giorno 20. December, fui chiamato dallo fredo in compagnia del Medico, e del Chirurgo, che lo tratto nello spazio de due mesi. Lo ritrovai quasi interamente libero dal tumor dello fredo, e perciò consigliai di non cangiar-

E 3

174

*Ita per natura omnia animalia sunt frigida, et
humida, unde generat sanguis non calidus, et mu-
tus in hominibus generatur, sed humor spiritus hor-
gunt.*

*Idem Comment. XXX. De m. pectore copiosa pituita
aqueus generatur, quoniam debet quoniam fredo fredo*

no, ma d'istituir per qualche tempo ancora nella stessa maniera di cura.

† 43.

Un tumore della gamba destra.

L'ammalato m'aveva mostrato un altro tumore largo quattro dita, che occupava la gamba destra al di sotto della rotula, qualche una pollice sulla faccia interna della tibia, della larghezza di tre pollici geometrici. Era di color naturale indolente, molle, e compresso da un dito non lasciava segno alcuno. Compariva manifestamente esser la sua sede nella sostanza cellulare. L'infermo asseriva essergli solo da due giorni sopravvenuto questo tumore. Mi fu detto poi che il malato avanti alcune settimane aveva urtato della gamba contro una panca della Chiesa, ma nella parte opposta a questo tumore, e quindi d' essergli nati dolori acutissimi, e venuta in conseguenza una infiammazione nella parte esterna della gamba di una nocca, a cui gli venne in seguito, per il cattivo metodo di medicare tenuto, una legger carne: della cura della quale non so parlar, essendo cosa diversa dal mio scopo. Benché il sopracitato tumore situato nella faccia interna della tibia per ragione del luogo fosse meno molle di quello, che occupava per l'avanti lo scro-

to; indotto da non leggieri argomenti credetti essere della stessa origine e natura, cioè a dire prodotto da umori infamici stagnanti tra le lamine cellulari: quindi avendo osservato, che il tumore dello scroto, e del testicolo erasi perfettamente sciolto, mediante l'acqua di fiori di rose, e dello spirito d' *essence*, volli, che anche di questo applicasse un fomento composto della vigesima parte del medesimo spirito diluito nell'acqua.

Nel giorno 23. Gennaio 1779. trovai il tumore quasi interamente dissipato in guisa, che non rimanevano se non che gli integumenti più densi del testicolo, nel cui centro trovavasi prima il tumore; per quello appunto non visitai più l'infermo, ma lasciai al Chirurgo ordinario il termine della cura, assicurandolo non altro esser necessario, che fare delle frizioni col latte tepido, e Sapon Veneto mattina e sera per mens'ora.

Portatomi dall' ammalato il giorno 21. Febbrajo a prima vista rimasi sorpreso nel vedere, che la gamba destra era così gonfiata, che pel suo volume superava d'alto la gamba sinistra. Nell' esaminarla che feci, trovai il tumore più grande del pugno, più molle, e più protuberante, il resto poi della gamba tutta edematosa. Indagando la causa di questo subitaneo engorgamento risentii altro poco nascogliere, eccetto che l'amma-

lato aveva fatissimo la gamba ballando, e che al veg. di Dicembre gradì fornito del decotto di bardana, e di multa ordinatagli dal Medico ordinario. Consigliato da poi (da non so qual persona) portossi ad bagni sal-furri, i quali furono continuati per quattro settimane: l'edema, che non era che interstiziale, si sciolse; ma il tumore divenne più ribelle, e fatto più duro, e ridotto in figura ovale lunga tre pollici, e larga quattro, senza accompagnarlo da tanti dolori, che l'infermo fu costretto ad abbandonare il bagno, e a ritornarsene in Città il dì 12. Marzo.

§. 64.

Tre altri tumori sospesi.

Sul principio dei suddetti bagni, nel maschio, che si lavava il corpo, si scoprirono tre altri tumori, uno della grandezza d'una nocce nella mammella sinistra, l'altro assai grande ma molle che copriva tutto il gonocchio sinistro, il terzo duetto, lungo tre pollici geometrici, largo due verso la metà della medesima coscia, e nella parte esterna tra il muscolo cotto, e vasto esterno: erano tutti indolenti e nella lor superficie di color naturale. Ecco adunque quattro tumori della stessa specie nel medesimo corpo, differenti soltanto nella loro situazione. Acciò non si

confondere le cure, passerò a dare la delusione particolare di ciascuno.

§ 43.

*Il tumor della gamba destra superato col
caviglio potenziale.*

Nel tempo stesso del bagno si adoperava la doccia, sulla speranza di ottenere la risoluzione, per cui invece è accaduto, che il centro del tumor, è divenuto rosso; per la qual cosa si dovette cangiare indicazione, e perciò si pensò a tentare la suppurazione e a quest' effetto ordinai l'empiglio di diachilos colle gomme alla grandezza di due dita, coprendo il centro del medesimo con dell'unguento balsamico; per coprire poi il resto del tumor si mettevano dei buchetti ripieni d'orbe ammollenti e risolvuti; separata la cuticola nella parte rossa, in pochi di scomparve anche il rossore.

Nel Consulto Medico-Chirurgico fu deciso, che si contenesse nel tumor delle marce, e che perciò si doveva aprire. Per quanto mi sforzassi addurre delle ragioni in contrario, ciò non ostante fui costretto nel giorno 16. febbrajo a fare un'incisione sopra il tumor, specialmente perchè il tumor, che era al di sopra del giuncchio trovavasi assai lontano dall'articolazione, e per-

E 5

che

che fui ammucolato dall' esperienza di poter per mezzo de' caustici distruggere à poco à poco la fungosità, che sarebbe d'indi nata. Feci adunque l'apertura nel tumore alla profondità d'un pollice, e mezzo, da cui sortirono alcune gocce di siero; allungate le labbia della ferita compariva in ambarcha lo parti un corpo lucido, e gelatinoso a guisa della polpa di un limone spaccato. Tentata per ogni verso la compressione sul tumore tagliato, non si otteneva, che come già dissi, alcun liquore (*). Sopra la ferita applicai nel primo giorno dopo l'operazione il digestivo di trentina scelta col uado d'oro.

Nel

SPERIMENTAZIONE

(*) Se la gelatina fatta di parti animali e, p. dei piedi di vacca, ridotta di poco di vino, d'aceto, ecc. passa in un vaso da in un luogo temperato, dopo un giorno o due incomincia nella conservazione a farsi più tenue, e più fluida, se poi si lascia nel per più o meno, sopra la gelatina si distingue in liquore. Che se poi si lava continuamente il liquore nella conservazione, all'ultima rimarrà una resina, che passerà in diversa sostanza. La stessa sostanza se invece l'acqua sopra, se si spargono all'aria, o se si trattano colla colla spiritosa, ed evaporati. La stessa sostanza, se non viene da acqua colla scelta, non può essere alterata dai vasi metallici, solo se si sape, che quella deve a conservarsi nei vasi metallici si può inferire la natura più fluida, che per l'ammucolamento questa alla medesima ne ritarda.

Nel giorno seguente trovai della carne fungosa un poco rossa e duella, la quale non solo riempiva la cavità della ferita, ma ancora sporgeva al di sopra della labbra in grùla, che erano rovesciate. Per levare questa fungosità, ed eccitare la separazione si adoperò il precipitato rosso per alcuni giorni, ma inutilmente. Indi applicai ogni giorno, oppure ogni terzo dì, secondo la necessità del trocisco composto di precipitato rosso, e assuec abbinato legato insieme con gomma arabica, e posti in maniera diversa da addattarsi acconciamente alla parte, che doveva essere discesa. E così separatamente su ciascuna dell' altre, alla fine si continuò internamente la carne fungosa. Quando si arrivò al periodo della cura, quello venne coperto con un pannolino imbevuto di mel di rose. Per mettere poi sotto gli occhi tutta la fungosità, convenne, d'io apersi la strada e successi faccettivamente cinque incisioni, tre delle quali erano alla un pollice e mezzo, e le altre due dieci linee. Avanti che coll' ajuto di suddetti trocisci fosse discesa affatto la carne fungosa, nella parte malata non sentiva dolore alcuno, ma allorché il fungo fu del tutto costituito, la piaga erasi resa tanto sensibile, e tanto irritabile, che al leggerissimo tocco della sfilacea nascevan vivacissimi dolori non solo nel fondo dell' ulcere, ma ancora negli

integumenti belli. In tal caso adunque ag-
giunsi del nitrato in poca quantità al diges-
tivo trebbiatissimo, e con tal felice successo,
che l'infermo nel dì 6. di Luglio rimase per-
fettamente libero da questo tumore.

§. 66.

Tumore della mamma sinistra.

Nell'intervallo di sette settimane fu gua-
rito il tumore sinistro della mamma sinistra in
vicinanza dell' areola, grande come una uovo
coll' applicazione dell' empieglio di danti-
don colla gomma, e il Chirurgo ordinando
avanti la accidua medicazione strofinava
per alcuni minuti sollecitamente il tumore
con del Sapon Veneto, e del latte tepido.

§. 67.

Tumore della coscia sinistra.

L'altro tumore indolente, molto esse-
so, e duetto occupava la coscia sinistra.
Questo ogni mattina e sera li fregava legger-
mente con del panai di lana, e di liqo im-
bevuto di qualche fumo aromatico, e dopo
la frizione, veniva la coscia stessa involta nel
medesimo panai. Nello spazio di tre mesi li
ridusse il tumore minore d'un terzo del suo

volante, ma fatto nel tempo stesso più duro, e più mobile dolera benchè non venisse toccato. Ne è da meravigliarsi, imperciocchè le frizioni fatte troppo forte agguassavano quivi istantaneamente ed in luogo di disporre gli umori alla risoluzione, privandoli per mezzo delle medesime della parte loro più fluida, avevano resa maggiormente densa la parte più crassa.

Durante l'esacerbazione del dolore non ho voluto tentar cosa alcuna; dopo alcuni giorni poi, quando il dolore aveva ceduto, ordinai, che si facessero mattina e sera delle frizioni per mezzora con due parti d'unguento neraleo, ed una parte d'oglio di neraleo, e un poco di Sapon di Persia; in pochi giorni non solo cello interamente il dolore, ma ancora il tumore cominciò a divenir molle, e diminarsi: nella xvi. giornata oltre le frizioni fatte coll' unguento sopracennato, feci applicare l'emplastro di cicuta. In poco più d'un mese il tumore svanì in guisa, che non vi lasciò reliquia, nè vi rimase senno alquanto di dolore.

§. 62.

R e c i d i v a.

Passate quindi cinque settimane, si vide d'Agosto comparir di nuovo nel luogo stesso

Stesso un tumore, più molle per altro d'allui del primo, minore, e senza dolor. Non potrei scoprire la cagione manifesta; non solo, che l'ammalato dovette giacere a letto per cinque settimane a cagione del tumore dell'altra gamba. Emendatosi poi il vizio di questa, a segno di poter camminare, giudicai opportuno di far fare delle passeggiate all'ammalato a fine, che coi muscoli, e dagli integumenti mollesce nel tumor medeo, farsi una legger frizione agevolata dalla proporzion della tonaca cellulare, in grazia di cui la linfa stagnante si potesse staccare, e cacciarla in moto. Per conseguire con più certezza questo scopo di guarigione mi sembrò necessario di aggiungere le fomentazioni secche co' fumi aromatici, come nel primo tumore, che calava nel medesimo luogo, più leggeri però e di più breve durata, perchè qui il dolore della parte affetta non era spontaneo, come in quello di sopra, ma era nato soltanto dalle frizioni. E così finalmente la calcia dopo tre settimane fu liberata ancora da questo tumore.

§ 69.

Tumore del ginocchio sinistro.

Il quarto tumore, di cui ne dà la descrizione, propriamente appartiene a questa
 luo-

luogo, imperciocchè egli era un vero *Fuogo dell' articolazione*. Risiedeva nelle parti collocate in vicinanza al ginocchio, come nei legamenti, nella sponcurosi, e nella tunica cellulare. Nella parte superiore si estendeva più largamente cioè sopra il muscolo retto, il vello interno ed esterno: sotto la rotula poi non estendeva in larghezza di due pollici. In nessun luogo doleva, fuori che sotto la rotula, e soltanto nel toccarlo.

L'Infirmità non poteva pigliare il ginocchio per il troppo volume, e durezza del tumore. Nel Consulto venne concluso, che si dovesse osservare il metodo adoperato nel disprezzato tumore della coscia, in allora ancor presente, perfezionando il tumore con dei panai di lana o di lino impregnati di fumo aromatico, e dopo le finzioni coprirlo cogli stessi panai. Ma avendo fin dal principio del male di maggio incorso in dolore, e a renderli il tumore più duro, specialmente sotto la rotula, dovremmo tralasciare le finzioni, e l'ammalato era obbligato al letto.

Le finzioni però del tumore della coscia si continuavano, dalle quali si raccoglieva, che gli umori qui flagranti dissipati si andavan deponendo nel tumore del ginocchio, il quale cresceva in ragione dello spostamento del tumore della coscia. Convenne tra noi adunque di applicare a questo tumore
del

del ginocchio un fomento di fiori aromatici di *lavanda*, *rosmarino*, *roze*, *finocchio* infusi nel vino con metà acqua. Nel quinto giorno nella parte inferiore trasi il dolore: nella parte superiore l'infermo pativa un senso di tensione molesto; il tumore però era diminuito. Per la qual cosa ornai si vinse il misero gli belli fiori in infusione nella sola acqua per il fomento, quale si usò in pratica per cinque giorni ancora. Quantunque quello fomento rendesse il tumore più molle, e togliesse il senso di tensione, pare se abbandonato e vi si sostituissero i sacchetti ripieni dei medesimi fiori, aggiungendovi un po' di canfora, il che si continuò per dieci giorni, ma senza effetto.

Siccome si sentiva una falsa fluttuazione nel tumore, specialmente sopra il muscolo vasto interno, credettero alcuni de' consultanti, che dentro si contenesse della materia stravalsata, alla quale convenisse dar esito; ma protestai con franchezza che non mi farei mai indotto all'operazione, la quale doveva attirare per necessità due gran denti, cioè la perdita prematura dell' anello, e la mia riputazione, essendo io dall'esperienza convinto dell'alto pericolo dell'apertura di tali tumori. Fu indi proposto doverli applicare un fusticchio: anche a ciò mi opposi, perchè era fiero di scappare in una parte d'altronde lontana un più vivo dolore,

ed

ed il vantaggio era affai incerto. Quindi vedendo esser il tumore affatto molle, e capace di risoluzione applicai diverse fopra pelle sottile l'empiastra gliacacea, col quale, rinnovato ogni giorno si copriva tutto il tumore.

Pochi di dopo nacque un prurito in tutta la superficie del tumore affai molesto; spuntarono dalle piccole pustole nel luogo dello, non dissimili dalle rosiiari, le quali cessando di poi mandavano del siero in grana quantich. Cessato pochi giorni dopo e il prurito, e il flusso di siero, diminuiva sensibilmente il tumore in guisa, che nell'ottavo giorno l'ammalato appoggiato ad una sedia nella stanza poter passeggiare, e dopo passate quattro settimane, dissipatosi del tutto il tumore, pote liberamente camminare. Pare sul terminar della cura per corroborare le parti rilassate feci aggiungere all'emplastro gliacaceo un poco di jascino, il che si continuò, rinnovandolo ogni terza, o quarto giorno, per cinque settimane ancora a titolo di maggior sicurezza, e insieme per impedire la recidiva, che spesse volte dà asilo ad una recidiva, e gli ordini di tener lasciato il ginocchio.

Questa fu la regola osservata nella cura interna degli anedoti quattro tumori: da principio gli si davano per alcuni mesi van decotti rilassanti, solventi, ed evacuanti:

F

ed

ed altri medicamenti collo scopo di depurare il sangue, ma non troppo accorsi a questa malattia. Ha fatto uso ancora l'infermo per cinquantacinque giorni d'un elettuario antiflogistico formato di conserva di ragnatino, e di cruetor cortare poco spessa usata fra la giornata. Ogni qual volta poi accadeva, che avesse tre o quattro volte beneficio di corpo, il tumore si vedeva ad evidenza cozzere maggiormente, il che dipendeva unicamente, come lo dimostra la ragione stessa, dai purganti, e dai solventi adoperati per lungo tempo (*). Possono es-

sere

(*) Sappiamo di certo, che quella stessa non fu tenuta per il Parlapiaggio Italiano, e per i suoi' di. Ella infatti doveva essere una di quelle, che doveva il più interessare il Governo di qualunque altro, e che doveva nel tempo stesso essere il più affezionato, ed alligato della più grande individualità. In non vi è allora bisogno di dimostrarci ciò, che l'arbitrario applica a parlare di spaziosità, in la sua natura la sua presenza non gli avrebbe fornito di guida in tutto il discorso della spaziosità. Per la sua maggior forza, ovvero due, che la sua forza prima fosse una potenza del più potente, del più illuminato e più giusto de' Virati, avendo egli dovuto considerare per ipotesi il male, e renderlo una questione per lui il bene; ma senza quella potenza logica non avrebbe potuto esibire a tutti i suoi lettori.

Se tuttavia non molti accordi a tutto, che non intendano che il successo non de' suoi servizi manifesti con un solo d'ammirazione, da

fare qualche volta necessari i purganti, specialmente allorché v'è ostinazione di seggio, e troppa quantità d'umori; ma se vi è debolezza di corpo, e stallo di fibre, il loro abuso è nocivo, perchè si stallo maggiormente le fibre, e gli umori si staggono di più in guisa, che per tal ragione ne può nascere l'icterizia (*). Vuole adunque concludere, che si trascurasse l'elemenare, e qualche genere di rimedi stallo, e purganti, non meno che quei cibi, atti a render più densa la linfa, che quelli, e quelli debilitano le fibre essendo egli accostumato a nutrirsi di cibi farinacei, grossi, ed indigesti. Verso la metà quasi della cura proposi per cardico un pocco blicchiere di vino di Tokai da be-

ve.

Infermar l'uomo il più saggio, che non si può fare, eppure per fare. Vedeva tutto, leggeva tutto, e pure la prudentia voleva, che si dimenticasse quel ciò, che interessava la sua persona, ma non dimenticò però ciò che tendeva la persona sua al bene del suo ammalato, che rispondeva malissimo. Rimaneva ferente da un male in luogo un bene, non dove dire, che dovea quel malato e del malato e del malato, che a volte, stallo a l'ultimo l'Academia Medica - Clinica, e alcuni non di pochi, se non quelle magnificenze, nella quale ebbe con pubblica ammirazione.

(*) V. *Principia Canonica* K.V. Quasi alla maniera di un, per alcuni uomini, *Principia Canonica* gli altri.

venne a pranzo (*). Da quel tempo, che
 si cambiò il metodo della cura, ogni cosa andò
 d'aver a secondo, e l'ammalato nello spazio
 di sei mesi si liberò interamente da tutti
 quattro i tumori, e ancora'oggi gode ot-
 timo salute.

DIS-

(*) Van-Swieten Comment. LXIX. de morbo a gland.
 uelis spontaneo. Omnes faciles plerumque cum
 aqua solvantur lentissime.

Idem Comment. XXXVI. Similiter ab ungula plu-
 guis molles pilulas parvas decant experimenda.
 Non perfumas facile autem fibræ profusius naris
 distendi, ut sit capax de puritate regiderit.

DISSERTAZIONE II.

SO PRA

LA COLICA SATURNINA

DEL

MEDESIMO.

§ 1.

Etimologia della colica.

Ippocrate, come parlò di tutte le altre malattie conosciute a suo tempo, così fece anche menzione del dolor di ventre, senza però distinguere il dolor colico da quelli degli altri intestini, e visceri. *Diocle Caristio* diffuse il dolore degli intestini tenui colla voce *Cardiagga* dal dolore degli intestini crassi, che egli chiamò *Ileo*. *Celsio* contemporaneo di *Celso* fu il primo, che separò la colica da tutti gli altri dolori del basso ventre, afferendo, che questa malattia fosse sconosciuta avanti i tempi di *Tiberio Cesare*. *Filoso Tarso*, probabilmente d'età non inferiore a *Diocle* e *Celsio*, tra gli altri ri-

§ 2

mo-

medici da lui ritrovati, si gloriava di possedere anche un medicamento efficace nella passione colica. *Paolo Eginetta* (*) ci lasciò l'istoria d'una colica, che regnava epidemicamente in alcune Province Romane, i di cui sintomi corrispondevano esattamente a quelli della colica *Pittorica*. (**). Di poi *Galeno* ci ricorda anch'esso la passione colica; e finalmente molti medici, che vissero dopo di lui hanno divisa la colica in varie specie secondo la diversità delle cause, come sono la colica *biliosa*, *flatulenta*, *nefritica* *passion-dica*, *ameroideale* etc. nella qual occasione forse sarà accaduto, che que' scrittori abbiano confusa quella colica, di cui noi siamo per trattare, colle altre specie di coliche.

La colica saturnina.

Il nostro scopo è di qui aspettare alcune notizie, che interessino la pratica, attinenti a quella specie di colica, che avendo l'origine, e il nome dal *piombo*, ella *saturno* de' *Chinesi*, si chiama colica *saturnina*. A questa malattia, come è volgarmente noto, vanno soggette specialmente quelle persone, che cavano i metalli, quelle, che si trovano nelle miniere di piombo, e parenti quegli *Artifici*, che sogliono maneggiare quel-

(*) Dell' uso de' medicam. lib. 3. cap. 49.

(**) *Populi della Pannonia*, oggi di detti del *Pala*.

questo metallo, e i di lui preparati Chimici.^(*) È siccome i Pittori adoperando continuamente in quantità la biacca vengono affetti di frequenti attaccati da questa malattia, così da alcuni scrittori viene detta *Colica de' Pittori*. A me stesso molte volte è accaduto di essere sofferto Amefici sopraffatto da una tal malattia. Poco tempo fa avvenne, che sei compagni d'un Pittore, che s'era obbligato a colpire colla biacca le armerie delle sale degli Accademici, nel medesimo travaglio caddero ammalati ad un tempo stesso afflitti da quella colica letale con spasmi, e convulsioni.

§. 3.

La denominazione di questa colica si dalla causa, che dal Paese.

Regnando questa malattia nell'anno 1575 in Francia, ed affliggendo sopra tutto il popolo di Pittavia, il Medico Civile la chiamò *colique des Postoux*, ^(**) il qual nome lungo tempo dopo Cuiuso fu ritenuto dalla maggior parte dei Medici. Unanime poi la nominò *Colica Danmange*, ma

F 4

Eber.

(*) È particolare l'osservazione del Sign. Storci nell'ho piccolo trattato della colica de' Pittori, Lapi. 1779. dove dice d'aver visto ammalati attaccati da que' sintomi che sono comuni alla colica provocata dal piombo, senza che essi avessero mai trattato alcuna di que' metalli, che generalmente vengono impiegati come causa di questa malattia; anzi afferma che in Napoli nessun tal luogo, nessun accademico o pittore ha mai toccato a quella infermità. ^(**) Nel quale nome della colica posta il Pittore. Pittori afflitti.

Eleonora Gasella riguardando l'origine la diede di nuovo il nome di *colica de' Pastori* (*). Il primo però di tutti, che scrisse di questa malattia fu il medico Tedesco *Samuel Stockhausen*, (**)-che sembra d'aver osservata, e scoperto provenire la vera cagione di questa malattia dal solo latte.

$\frac{1}{2}$ 4.

Quali nazioni siano soggette a questa malattia.

Ciascuna nazione, dove v'è il costume di conservare in vasi di legno o di piombo gli alimenti, e le bevande acide sotto a cerchietti di questo metallo, va soggetta a questa malattia, per la qual ragione in alcune Provincie della Spagna cioè quella infernale chiamata *Andalusia*. Appressa gli *Ungari* ancora,

... *do*

(*) *Scrive anche dell'anno 1789, che si trova al* *Giornale d'Europa* tradotta dall'anno del 1789. *Wien 1789.*

2. *Quasi nove anni sono a Parigi veduto per un* *qualche più volte bevuto del latte del latte addensato* *nel latte.*

3. *Scrive negli Elementi di Chimica nel processo* *per due d'aver veduto, che l'acqua di Salsola* *grasse, aveva solo un odore, e in un altro tempo* *ricorda che per sapere del medesimo ha veduto* *in prima e seconda di molto latte.*

(*) *Trovato sopra il latte d'asina, e molto più* *prezioso del latte, e sopra la malattia più fre-* *quente appunto, da un cavallo, che si trova, e dal* *Tedisco, Persiano, Indiano, e Siamese.*

Costa, sopra la...

dove le tegole dei tetti hanno un aspetto di piombo di color bianco fiavesc. che per il calore del sole si riduce la lor superficie in calce, e questa dilata dalle pioggie impetuosissime infetta colla sua forza velenosa le acque raccolte per uso domestico. Avanti 4 anni questa Campora (*) che per tutta l'Olanda infetta terribilmente questa malattia. In Amsterdam, e in altri luoghi dell'Olanda, dove la plebe suol conservare le acque nelle cisterne di piombo, si vede regnare oggi giorno quella colica.

$\frac{f}{1} \quad \frac{5}{2}$
Se la colica saturnina differisca dalle altre coliche metalliche.

Piacque al Stoccolmesio, e al suo Commensatore Gardano di chiamare ancora questa malattia colica metallica. Questa parola però a mio giudizio, e presa in troppo largo senso, e non coglion che una nozione indefinita, imperocchè da altri metalli ancora per esempio dal rame, solimato, corosivo, antimonio etc. si possono eccitare dolori colici forti, i quali però per i sintomi loro particolari, come vomito, diarrea etc. differiscono dalla colica

F 5 ca.

(*) Elipola di uno della Isola Olanda data in memoria del primo. Ovre ad Amsterdam 1735 pag. 125.

co saturnina. Quindi abbinoce la cronaca di *Friderico Ossmanno* (*) di *Vedelo* (**) *Boergio*, *Beckero*, (***) e d'altri uomini sperimentati nell'arte, i quali affermano, che la colica saturnina nasce dal solo piombo.

§. 6.

Carattere della colica saturnina.

Dall' esperienza bastantemente risulta, che la colica saturnina, (non è così simile alle altre specie di coliche,) non è una malattia infiammatoria. Qui non si trovano segni di manifesta lesione, nè v'è alcun vizio negli intestini si vena, che crassi, nè nel mesenterio. E' più probabile però, che il piombo agisca negli intestini colla sua forma allungata, ed elicante, e venga esso deglutito, o in forma di vapori portato ai polmoni, o riflesso per mezzo de' vasi linfatici della cute. Si potrebbe qui opporre darsi in natura altri corpi, che sono dotati di virtù, e proprietà egualmente che il piombo, senza che possano produrre il medesimo effetto. Facciamo però le suppo-

sizioni

—————

(*) Nella *chronica et anastolici* *Carter* 3. cap. 3.
e nella *Differenzia della metathorica nervosa*, e
nel *plano nazionale di medicina* *Beano* 3. cap. 3.

(**) *Differenzia* *lapis* un *comitato* *attorno* della
Colica Saturnina, *Ann* 1791.

(***) *Trattato di medicina*, citato dal *collega medico di*
London pag. 102.

più affetti nel piombo una qualche specifica acrimonia intrinseca a tutte le parti del corpo umano in guisa, che eserciti la sua forza violenta specialmente negli intestini; in allora sarà facile la spiegazione del ganglio o della paralisi, e degli altri sintomi prodotti dal piombo. Già Dioscoride, Aesculapio, Avicenna, Nicandro, ed altri non ignorarono quella acrimonia particolare del piombo.

§ 7.

Annotazione circa la cura in genere.

Alcuni hanno proposto in questa malattia come utili rimedi gli Emetici, ed i purganti drastici, tra i quali il Siga. Brevelle, credendo dover così levarsi con forza il muco, che ha tenacemente attaccato alle pareti degli intestini, e d'altronde non poter ciò ottenere senza uno scostimento del sistema nervoso, delle fibre intestinali, ed alla fine di tutto il corpo.*) Inverità quello metodo, che

65

(*) Il Siga. Costabauer ancora loda i purganti, e gli Emetici, come *Diutius afflicti d'aranea* usati solo con questo metodo. Distingue per altro che non si faccia una complicazione gallica. Mr. Thomson approva l'emetico quando la tosse sia recente, ed è di contraria opinione in tale diatesi. Il Siga. de Haen però in tutto il tempo della sua pratica non ha mai fatto uso degli Emetici, ed ha sempre pro-

cagiona un uso niente necessario alla natura già sconcertata dal male, giustamente dal Sig. deffaux, e da altri medici fu rigettato, mentre gli Emetici, i purganti drastici accrescono l'irritazione, gli spasmi, e le convulsioni, che pur troppo qui interiscono con forza; ed infatti alcuni in questa malattia facevano per effetto del muco sanguinosissimo colle feci, qualche volta per l'uscita coll'urina, il quale nasce da nessun altra cagione, che dalla violenta spasmodica contrazione delle fibre, che accompagnano questa colica: inoltre non deriva facile spollilano l'affinità oltrazione di corpo, perchè il tubo intestinale è privo del suo muco necessario? Dunque se eliminiamo e l'indole velenosa del piombo, e la veemenza de' stimoli nasci in seguito, se viene per necessità, che i medicamenti semplici devono essere nocivi, parimenti non sopo poter arrivare il caso, dove per ragioni di circostanza particolari convenga un Emetico, o un purgante drastico combinato cogli oppiati nelle coliche cioè provenienti da tutt'altro veleno preso, ma nella colica saturnina certamente è pericoloso il loro uso. Imperocchè se smentia-

MO

Inte l'uso dell'aglio, e del lattaro, non afferma d'aver potuto per mezzo degli stessi ed opposti dadi in abbondanza prevenire la puzza, e l'infiammazione: deluso.

mo all' irritazione presente, all' ostinata congestione di ventre, e ai tanti spasmi degli intestini, e di tutti gli altri vizi addormentati, che fanno ritirare in dentro l'ombelico, e inalzare l'insidia verso all'insù; se finalmente chiamiamo la difficoltà dell'edema, e la totale sua soppressione (come i più frequenti sintomi di questa colica,) in allora è facile dimostrarci, che soltanto i rimedi ammollienti sono indicati in questa malattia, e con fondamento d'esperienza, la quale sufficientemente ci comprova il vantaggio dei medesimi.

Un Chirurgo maggiore militare, uomo molto esperto, e pieno di meriti, da quel tempo che prese in questa malattia una piccolissima dose di Zaccaro di Setuano, andò soggetto agli insulti della colica Saracena. Per lo più veniva attaccato due volte l'anno, e specialmente allorchando dimenticavasi di tener lubrico il corpo, e non s'atteneva alla dieta esatta. Questa malattia veniva accompagnata da al forti spasmi che le articolazioni dopo ciascun parossismo rimascano per qualche tempo paralizzate, e affette dai gangli. Coll'uso dei bagni ammollienti, e delle frizioni qualche volta dopo alcuni giorni, e altre volte sol dopo alcune settimane venivano superati que' mali infernali della colica intermina. Per ajutare questa norma nei suddetti parossismi di colica mi sia
 Ser.

servito per il decoro d'alcuni anni dell'eglia di mandorle con alcune gocce di *Laudano liquido*, che trovai il più efficace di tutti gli altri rimedi. Ultimamente a Praga nell' 1757 bevetti alcuni bicchieri di birra, cadde nella stessa malattia. Vari medici, che si trovavano all'assistenza del malato credettero una colica flatulenta, e a ciò direllero la loro cura, e così l'ammalato non poté fuggire gli artigli della morte.

La medesima cura preservativa di quelli, che trattano i metalli, i quali seppero utilmente guardarsi contro i vizi mali, che potrebbero sovvenire nel maneggiare il piombo, ed il rame coll'uso dell'oglio, bagnar, lardo *) molti cogli alimenti, quella cura dico, s'aggi in certa qual modo essere del Medico dello amato. *H. Romandi* (nell' aureo suo libro delle malattie degli Artifici Cap. VI ed VIII delle malattie del Pittori, e di quelli che fan uso dello stagno afferma, che i sintomi provenienti dallo stagno) che *Piscia* chiama piombo bianco, sono i medesimi di quelli, che nascono dal piombo, cioè

Falsa,

—————

(*) *Sandice del dandice*, che l'esperienza infermista l'osservazione del Sign. de Meun, il quale dice, che passano i vapori, che hanno nelle anghie gran parte della colica facendo non per sottrazione del punto non per sopra del lardo e bagnar avanti d'arrivarsi al teraglio e a prima venuta alla casa se la della lardo.

fisma, le affezioni ipocondriache, le convulsioni, i tremori del metebri, ed altre malattie pericolosissime del ventricolo, e degli intestini. Quindi per cura di tale malattia consiglia l'uso del batiro, del latte, dell'emulsione di mandorle etc. indi avverte di dover seriamente evitare tutti gli assuefatti ed effluvi.

E acciò più evidentemente comparisca la verità di quanto'è stato da me detto circa il metodo di trattare la colica *faturnina*, e talora di metter sotto gli occhi la vera immagine dei sintomi, che occorrono in essa, riferirò le storie di tre ragazzi, le quali in grado dell'uso del batiro ebbero a soffrire terribili coliche *faturnine*. Una di queste guari, e le altre due miseramente perirono.

§. II.
Primo caso.

Un Ufficiale d'Artiglieria nel giorno 13 Ottobre 1784. colle lagrime agli occhi portosi dall'Augustissimo Cesare, supplicandomelo acciò si degnasse di mandar me da una sua Figlia di 17 anni, attaccata dalla medesima malattia, di cui la sorella maggiore, dopo aver tentati inutilmente tutti i rimedi, sorpresca da convulsioni passò agli eterni riposo. Pochi mesi prima il nostro Clementissimo Sovrano, che fuol facilmente commoversi alle calamità di quegli infelici, che

par-

portato al Trono giuste preghiere, e che non lascia partire giammai persona alcuna senza consolata, m'ordine d'andare a visitare quella giovinetta. Era di dopo pranzo, e trovai la malata che giaceva in letto, oppressa da letargo cagionato dal veleno, e che delirava a capriccio, specialmente quando i dolori colici, che duravano già da otto giorni, si trasferivano più violenti. Uno dei più esperti Medici della Città aveva tentati tutti i rimedj, che si sogliono adoperare nella colica nata da flatulenza, o da soppressione di traspirazione. In quel tempo dovetti partire dalla Città; frattanto fu d'uopo accontentarmi della storia riferitami dai parenti circa tutto ciò che fu fatto nel tempo della malattia d'Archibodo le figlie, della vivente cioè e della già morta.

L'inferma lagnandosi di fortissimi dolori nel ventre, non potendo sollevarsi in alcuna maniera il talto della parte dolente, il ventre dalla spasmodica contrazione dei muscoli addominali così fatto concavo e albi duro; l'ombelico quasi aderente alla spina del dorso; i dolori affalivano il petto ancora; temeva l'asfissia, grande il dolor di testa; forte la tensione alla naca, v'era la paralisi e le contrazioni delle estremità inferiori, e superiori, e le movenze dagli affetti, si egualvasi il dolore, il polso calere, debole e piccolo, ed intermittenza; l'orina stillava con difficoltà.

14

ta, e soltanto a gocce; non aveva beneficio di corpo, quantunque gli fossero stati applicati molti clisteri con seltica; lo stato dell'ano era ristretto, e costante; pari sintomi, che caratterizzano la vera colica saturnina.

Trovai applicati al ventre dei sacchetti caldi, ripieni d'avena, v'era ancora una emissione marcata, che in quella stessa giornata aveva incominciato a prendere l'ammalato, ma senza febbre. Alla sera del giorno precedente sembrava imminente la morte, mentre si osservava tutto quello, che fu rimarcato totale negli ultimi periodi di vita nella scottia; quindi si elaborarono i sintomi, e le convulsioni periodicamente da cinque volte si fecero più violenti coll'abolizione de' sensi. I Genitori tristi per la perdita d'una figlia, e atterriti nel vedere gli sintomi stessi nell'unica altra superstite, già disperavano della vita della medesima. Del resto esaminatore il maestro a tutta ragione giudicai doverli adattare la vera etia di questa malattia alla sola colica saturnina, e quantunque non avessi risparmiata fatica nel rintracciare la cagione, poco però mancò, che questa non mi rimanesse incognita. Nel pensar che faceva sopra d'ella per acciattare voltando gli occhi verso la madre, che trovavasi presente, m'azzardi che il colore della di lei faccia era più bianca del naturale ed aveva le dita delle mani contratte, e tremanti.

G

Ela-

Esaminando la cosa con maggior attenzione, chiaramente sospesi, che il colore era lattino, quindi m'incorse il sospetto, che dipendesse la cagione del posendo con cui fusi il belletto; finalmente manifestossi la verità, afferendo da poi tanto il Medico ordinario, che i domestici di casa essere la cosa come io sospettai.

Questo già mi bastava per conoscere perfettamente la natura della malattia. Prescrissi adunque dall'oglio di mandorle dolci fatto di recente, e del Laudano liquido del Siderario, e l'ammalata doveva prendere ogni ora alla dose di un oncia con una goccia di Laudano. Fra mezzo all'uso di tal rimedio, dovevasi bene sapere ora del brodo di carne, ora dell' infuso d'erba d'altra; le furoso ordinati dei lavativi composti di brodo di carne con oglio senza neccesse da ripetersi sovente; si ungeva il ventre con dell' unguento d'altra, oglio di nerbagio, e castoreo, il tutto mescolato assieme; di poi vi si applicava caldo un cataplasma fatto di mellica di pane bianco e assaieno cotti nel latte, quale si rinnovava ogni ora. Appena che l'infanta prese la seconda dose d'oglio di mandorle con il Laudano verso la mezza notte provò dell'alleviamento; e tanto felice fu l'effetto di questi rimedi, che le convulsioni, le quali ne' suoi giorni giustavano afflisse l'ammalata, ora scomparvero; si

finì.

si fosse il corpo abbondantemente, e le fecchie erano dure, e rotonde; il sonno, che per l'avanti era talmente interrotto (talto che qualcuno non valesse avere per sonno silenzioso, il sopore, da cui tutto tratto veniva oppressa l'anima) che negli otto secoli giacni non pote in alcun modo dormire, e qui il pote in varie faie per lo spazio di quattro ore circa.

Nella mattina seguente convenni dall' inferna col Medico ordinario, il quale osservando un evidente miglioramento nella malattia, approvò il mio metodo di cura: l'achetamento d'affai i dolori di ventre, e del capo, e la tensione ancora alla naca; il polso si fece più forte, e più di raro intermittente. Per la qual cosa giudicammo di dover lasciare ne' di già prescritti rimedi fino nella vigilia di giorno dello stesso mese. Nello spazio di questi giorni tutti i sintomi si emendavano in guisa, che restò soltanto un piccolo dolore di ventre, e delle estremità superiori, ed inferiori; e non ostante l'anima si trovasse bene, pure il Medico ordinario meco credette di dover continuare l'azione col unguento, senza l'empiastrò, e l'aglio col Laudano, con questa condizione però, che l'inferna per l'avvenire non potesse la stessa dose d'ogni due, o tre ore: i lavativi s'applicavano più di rado. In questa maniera continuammo la cura per alcuni giorni,

diminuatolo a poco a poco la dose del rimedio, e già con sicurezza si permetteva a pranzo qualche legger panettella, dove per l'avanti non poteva esser restata che di brodo. In questo stato lasciò l'ammalato, dovendo partire da quella Città il giorno 17 Ottobre, ore sono meno pochi giorni dopo, la trovai un poco debole ancora, del resto sana a segno, che le effluvia del corpo soltanto rimanevano un poco parassitiche; ma quell'incommodo parimenti venne tolto in brevissimo tempo per mezzo delle frizioni secche.

Siccome era poco il mio obbligo di rinviare accuratamente la cugina di quella ai terribile malattia, facendo serie ricerche, venni a sapere per la seconda volta dai domestici, che ambedue le figlie, la di già morta cioè, e quella, di cui ho riportata la storia, per imbiancare il nativo colore brunito della cute nella faccia, e nel petto facevano uso grande all'essello dell'agratto di Saturno diluito nell'acqua, servendosi alle d'un simile inguano nocivo, e altresì del tutto superfluo, mentre la natura fu molto prodiga almeno verso quella figlia superflua, avendo ella due occhi assai begli, ed essendo dotata d'un aspetto elegante. (*) Solo-

FIN-

(*) Da che gli usi del decoro dell'antica semplicità del costume non erano più venuti dalla semplice
 alla

vano inoltre abbellire con molto rosetto (costare piuttosto meno pericoloso) le parti stesse di già rose bianche. Ma, come per propria esperienza avevano imparato, che in tempo d'estate il colore usurpato facilmente spariva, così più di frequenti, e in maggior copia otturavano la faccia ed il petto dei medesimi figli, finchè la faccia ivi accumulata ne formasse una patina. Per un trionfo intero furono assaliti in tempo d'estate da dolori colici, di cui, come leggiero e pallaggiero, facevano poco caso. Non è da meravigliarsi se le figlie abusassero incontinentemente di questo abuso, offendendo la madre ancora accoppiata; anzi ella stessa ne dava alle figlie da servirsi, quantunque la medesima da due anni soffrisse dolori colici, colposizioni di cor-

G 3

po

natura, e la continuava coll'ingegno, e la stessa realtà, da quel tempo le donne indiane offrono ancora la stessa di affettuosi trattamenti per la loro bellezza, e un gli altri di colori bianchi. E' innanzi al padre della desiderata di pueri. Abitudine dal quarto libro dei tre che Giustolich di dipinge le tinte di tinta per ottenere di più. In Jamboussie si osserva che all'incanto che induce un tumore nella testa d'alto della madre ed anche per molti altri tumori veri e falsi.

Finché si parla nella sua. Nel lib. XXI. Canon. 1. che le donne inglesi per evitare il calore degli Egitto si coprono il corpo di glorio, e che di cui serviva in alcuni luoghi per tingere la lana.

Le donne della Giamaica, e della Zimbabue si da del loro. Aglio in ingegno di poter sempre.

po «firmitissime, etc. (*) In tale stato di malattia propale il Medico alla donna il ferro di lana, ed altri rimedi: non giovando questi passò ai decotti emmollienti, ai bagni, e finalmente all'elettricità. Il Padre di famiglia aveva del pari cura della salute della moglie, che della figlia: scio non gli arrivasse la disgrazia di perderle o in breve, o costante da malattia cronica.

L. p.
Secondo caso.

Gli 13 di Gennaio dell'anno 1785 morì convulsa una figlia d'un certo Official Maggiore.

(*) Veggasi oltre qualunque quella osservazione da quel caso narrata da Giampa Roscher Medico, Inglese. A Veggasi un padre di un figlio attaccato da malattia cronica ne produce l'irritamento con più di una intenzione di vomitare, e d'inghiottire. La stessa febbre più o meno non parrebbe alle osservazioni, la di lui analisi dopo esser stata tormentata dal dolore, e dalle effusioni della vena addominale, dopo essersi finalmente rimessa, non così effe. La causa di questa terribile malattia, che regge in quella famiglia sembra in una maniera di puerizia, di cui forse si per via domestica, quale dopo che la chiamano, quarelli quella tutta curata. Dopo di ciò, una Tana del nome di medicina del Cielo dopo andare di Londra pag. pag. 1710.

La Triè adunque da noi fiduciosa a Paris France per l'osservazione del conseguenze del grado. Ditemmi d'aver altre riguardare come solo della maggior importanza: alla di cui osservazione, come
 „ Fiammi anche, in ogni più via domestica ed
 „ prendere una particolare, massima sulla
 „ stati intendendo sua.”

giare nell' età di 19 anni. Questa, per lo spazio di tre mesi ogni giorno lavavasi la faccia, ed il petto con della bianca saponata nell' acqua, avendo principal cura, che le mammelle di grandezza sufficiente risplendessero di color bianchissimo. Questa ragazza era di costituzione robusta, sempre regolata ne' suoi cost, ne ando mai soggetta a malattie terribili avanti l'uso del cosmetico; Verso la metà di Dicembre dell' anno 1784 cominciò a lamentarsi di dolori colici, e di tensioni alla testa; pare questi sintomi si attribuivano ad effetto d'un reumatismo. Dopo alcuni giorni crebbero i dolori nelle articolazioni del braccio, e della mano con dei movimenti convulsivi. Chiamato il Medico non formandosi alcun sospetto sopra il liscio, non scoprì la vera cagione della malattia, quale gli sarebbe riuscito tanto più difficile, quanto che la Madre della giovane inferma da tutt'altro avrebbe pensato provenire l' infermità, che dalla bocca, creduta cosa del tutto innocente. La cura consisteva in cose ammollienti, ed antispasmodiche. L'ammalata obbligata al letto per alcuni giorni in aspettazione del sudore, non dovendo comparir in pubblico, non credette necessario l'uso del solito liscio, e perciò se ne astenne. Passati alcuni giorni, essendosi interamente spacciato il dolore, abbandonò il letto, e ritornò la figlia all'uso del cosme-

co, qualunque dal tremore, che di quando in quando ricorrevano, dalla debolezza delle forze al grado di deliquio, dalle leggiere convulsioni, e dolori di ventre momentanei, avrebbe potuto argomentare, che un tale stato le veniva dall'esempio materno proibito, come inutile, e pernicioso. Il primo di Gennaio ebbe a comparire di nuovo in pubblico, e nell'ottavo giorno del mese stesso nel sortir, che faceva di casa d'improvviso fu sorpresa da dolori colici, e da convulsioni sì violenti, che fu d'uopo il trasportarla a casa, e metterla in letto. Richiamato di nuovo il Medico stesso, che l'aveva curata per l'avanti, ignorando tut'ora la ragione della malattia, credeva affetta l' inferma da passione isterica, quindi ordinò dei rimedi nervini, relaxanti, singalibge etc. ma in vano, giacchè nel quinto giorno finì la sua vita. Tanto nel primo, quanto nel secondo accesso di malattia, che afflisse questa Giovine, un certo Signore, che io non so venisse a sufficienza per la bontà che ha verso di me, corso da me nel migliore modo ciò che io credetti a soccorrere l'infelice; ma vedendo in ambedue i casi esser stati prescritti i rimedi dal Medico ordinario, non volendo mettere la falce nella tralla altrui, anzi piuttosto (non essendo stato richiesto di consiglio alcuno) stia da osservare, e no-

tare la storia esattamente del progresso, e dell' esito di questa malattia.

A chiunque va persuaso del grado che una tale vasiità cagiona al femininil ista sembrerà incredibile, che si possano trovare donne, le quali non abborriscono l'uso della bucca, e di tutti gli altri colmetici di piombo, e sopra tutto poi il mercurio sublimato corrosivo; (*) oppure ch' questo spesso succeda il contrario! Quindi presso, tale femmine si osserva una necrosi ne' denti (se non gli puliscono con diligenza) e nelle palpebre inferiori, attorno al naso si vede un colore tendente al nericio; la pelle della faccia è flaccida, e guastata, quindi nascono tensioni, spalmi, convulsioni, e dolori di vene. Che se qualche uomo prudente si mette a persuadere di tralasciare

G 3

l'uso

(*) Questo dono produce il sublimato corrosivo non s'ha potuto che lo ignori. Mercuriale delle arti capo della Decretazione al capo XII. pag. 16. dice d'aver osservato per l'uso del sublimato corrosivo divenir quella la faccia, ed il petto, e Placena nel suo programma della psillidura risponde d'aver veduto un' ulcerazione delle labbi cagionata dall' uso del sublimato, che divenne in poco giorni letale.

Credevasi naturalmente che la giunta nelle malattie in le del dente, perchè al fin di Ormai lib. 9. cap. 3. allega con argomento che gli Dei periti hanno il vizio non bene purgato, e la Impurità Romana risponde per approssimare la Maledizione di Dio: e da Roma scrivono diversamente le pueri di mine, dal qual fatto sembrare loro esser le molte donne a seguire l'esempio.

Tale di cosmetici preparati col piombo, usata largente di tutti questi malori, esse non vogliono assolutamente intenderla; imperciocchè ricalcitrando la vergogna di dover comparire deformi, specialmente in quella età che son cerca d'amatori della bellezza, ricorrono ai cosmetici servendosi d'essi costantemente, costantemente soffrendo ancora malattie terribilissime, che mai, chi lo crederebbe? tutti que' rimedi interni, ed esterni, che comunati ancora per anni vengono da esse adoperati, ad altro fine non sono diretti, che per imbellire più a lungo la pelle; e se il Chirurgo o il Medico liberamente dicesse, che la bellezza d'alcune femmine di condizione, (e quali per altro vorrebbero farcela credere naturale,) è lodata, e finita, corre il rischio di perdere la sua riputazione. Che dirò poi di que' Padri di famiglia, i quali chiudendo gli occhi, lasciano acculturare la moglie, e le figlie ad imbellettarsi, non curando il danno, che in tal maniera si regnano queste persone malchetrata? Del resto, siccome non è ufficio del Medico di correggere i costumi depravati; termino sull'istante dicendo d'aver scritto ciascuno di proferire le seguenti parole „questo nasce a te di più, questo nasce: e per ciò per non oltrepassare i limiti del mio dovere, ciò solo dico amichevolmente per quella donna, che disprezzando di moderare il loro

colore naturale, desiderano far risplendere il
finito, di far uso a loro beneplacito di que-
sti cosmetici meno pericolosi come p. e. *glissade*,
di *maria*, o di *madre perle*, o di *corde di*
benzoino, che il volgo chiama *bianca spa-*
gnuola; (*) per il contrario devono con ogni
studio guardarsi dai cosmetici proposti di
piombo, e considerarsi come un verme, che
mangiando i germi de' fiori, vanto del pari
guastando la salute, accio non possano cade-
re in malattie cotanto pericolose.

Per dare una descrizione più completa
dei sintomi, che solitamente s'incontrano
nella colica saturnina, e d'altronde, come
di sopra mi son proposto, di confermi il nostro
metodo di cura colle altre osservazioni, fi-
mo opportuno di inserirvi due storie di tali
malattie comunicatemi dal Sign. Dott.
Gabriel Professore di medicina pratica nell'
Accademia Medico - Chirurgica Gioseffina,

§ 19.

Terzo caso.

Un certo *Gaspard Kuhl* uomo di 36 an-
ni di temperamento languido, di consti-
tuzione sana, prima Pittore di professione;
ora soldato del *Reggimento Prilegom*, il
giorno 13 Marzo 1780, come egli disse

110-

(*) In generale i pigmenti che si estraggono da regni
vegetali sono i più innocenti.

raccontava, fu colto da dolori circa lo stomaco del cuore con vomito frequente, e stitichezza di corpo. Un suo concubito gli diede un Ematico, che dalla defecazione fuotorni condotti ebbe ipercatara. Ho veduto l'ammalato per la prima volta il giorno 1 g Marzo di mattina, e perciò nel terzo giorno di sua malattia.

Nel decorso di sua vita passata allori di non aver mai sofferto infermità alcuna, eccetto: che veniva molestato dai dolori di ventre spessissime volte, quasi per altro spiravano dopo alcune stitiche di corpo, sopravvenendo in seguito alla notte il fedore. Nel terzo dì di quella malattia il dolore dalla regione del cuore passò all'ombelico, e quindi infiorava colla della intensità per lo spazio d'alcune ore; i malsodi, ed i veleni addominali erano attirati alla spina del dorso; lo stomaco dell'ano s'era molto ristretto; il vomito era continuo di materie verdastre, acri, viscosi, il polso un poco febbrile.

Fatta sull'istante una cavata di sangue si somministrò il ventre con dei cataplasmi ammollanti, e gli si applicarono dei lavativi oleosi con qualche difficoltà, quasi per altro furono ritenuti. Internamente gli diedi da principio dell'acqua tepida, acciò si facilitasse il vomito, e il ventricolo si potesse liberare da quella materia acre, che vi ristagnava, e che somministrava il corso della cura. Po-

se dopo perfetti del sudore liquido di Sordano, di cui l'ammalato doveva prendere ogni due ore dodici gocce dilate in un oncia d'acqua finchè notabilmente fosse diminuito il dolore.

Dopo la terza dose venne la seguente un placido sonno, che durò per sei ore; svegliatosi di poi l'ammalato non soffrì alcun dolore; il ventre era meno teso. Sembrava ora il tempo di muovere il corpo; perciò gli diedi il seguente rimedio.

R^o. Olio di lino

Manna eletta

Miele puro aa. onc. due.

Il tutto stemperato sempre, indi si aggiunga,

Decotto d'orzo lb. 1.

L'ammalato ne prese ogni mezz'ora una bicchiera, e quantunque l'inferno non abbia rifiutato questo medicamento col vomito, pure non si sciolse il corpo; quindi dopo tre ore fu applicato un lavativo con del sapone di Venezia, e del miele. Continuando l'uso di tal rimedio, alla fine si aprì il corpo copiosamente, e con gran sollievo dell'ammalato.

Nella xvi. giornata alle cinque di mattina ricominciarono i dolori, ed aumentandosi questi finalmente di nuovo feci ricorso al sudore liquido. Dopo la prima dose sentì del vantaggio, ma non essendo stato que-
sto.

nello spazio d'un ora notabile, gli feci dare un'altra dose! I dolori poi dopo' mezz'ora cessarono interamente; diminuito il ventre, comparve questo al tatto più molle, il sonno fu di quattro ore tranquillo, che ristorò l'infermo.

Nel dopo pranzo si mise in poscia la stessa rimedia cicale, unitamente ai lavativi come il dì antecedente. In tre volte ebbe evacuazioni di corpo, alla notte non soffì dolore alcuno; il sonno fu interrotto.

Nel xvii giorno l'ammalato provossi meglio con nessun dolore di ventre, e con appetito buono. Credendo essere il tempo opportuno di dargli un purgante, ordinai un elettuario formato di polpa di Cagliar, e Rhubarbaro fatto dramma due, cremor di tartaro mezz'oncia, e miscel pure quanto basta da darli ogni mezz'ora una dramma. Avendo l'infermo già presa la metà di questo elettuario, e inoltre soffrendo nel ventre un senso non già dolorifico, ma piuttosto gravativo, consigliai che si potessero di nuovo in uso i lavativi, da cui finalmente si rese obbediente il corpo da sette volte.

La notte seguente fu assai tranquilla; alla mattina ripigliò il suddetto elettuario con felice successo.

Questo metodo di cura fu mollo in pratica per tre giorni, e l'infermo nel sesto di dalla malattia divenne interamente guarito.

4 11.

Quarto caso.

Sofiana Ricchina nobile d'anni 25 al 14 di November dell'anno 1776 fu attaccata da una forte colica detta de' Pitroni. Questa era figlia d'un Pitone, che nella giovanile età occupavasi a montare i coloni. Nel decimo quarto anno, andò soggetta alle spinte cruento, prodotto dal troppo billico, quale ritornava ogni anno la primavera. Io vidi l'ammalata per la prima volta nel sesto giorno di malattia, ai 20 cioè di Novemb.

Fin'ora ella fece uso del decotto di radice d'altea, la cui crassa sciolse due oncie di mirra, e tre dramme di *sale polveroso* ordinatogli da un Medico. Non si potevano applicare cataplasmi di sorta alcuna. In tre giorni non aveva avuto beneficio di corpo che due volte, e le materie erano somiglianti alle fiere di capra. Nello stesso giorno, che per la prima volta visitai l'ammalata, la ritrovai spollata di forze mancante d'appetito; mandava tutti insopportabili senza vomito però; soffriva dolori veementi e continui; aveva il ventre duro, appiattato, e l'ombelico ritirato in dentro. Non poteva orinare, che cessando i dolori. Le fu dato sull'istante un grano d'oppio, e due oncie d'oglio di mandorle fatto di recente, a volte, che

si ripetesse lo stesso rimedio, qual'ora non si calmassero i dolori dopo due ore.

Dopo l'altra dose venne in seguito un sonno di quattro ore. Svegliata alla sera non provò dolori di sorta alcuna, e il ventre era meno teso; quindi le si applicò dei lavativi oleosi, e prescritti una soluzione di manna con dell'aglio di li-
no da prendersi ogni ora un bicchiere. Ebbe due scariche di corpo in due fiati, e le mat-
terie erano dure.

Nel giorno XXXI di Novembre alla mattina comparvero di nuovo i dolori sopra l'om-
belico, i quali poco dopo inferirono aspi-
ramente. Gli fu data una misura opposta co-
me ieri. Oggi fu d'uopo di tre dosi, che
si diedero successivamente per sedare del tut-
to i dolori, cessati i quali l'ammalata dormì
placidamente quasi per cinque ore, e sve-
gliata, l'osservai d'animo quieto, ed allegro;
cedettero le contrazioni spasmodiche del ven-
tre. Si misce in pratica la soluzione di
manna coll'aglio, ed i clisteri ammollienti
come ieri.

Nel XXXII le evacuazioni di corpo in tre
volte furono molli, e in abbondanza. L'in-
ferma laggiù d'aver fame, e evidentemente
mangiò la leggiar panettella, che le fu por-
tata. Ordinai nella stessa giornata, che le
si applicassero dei lavativi ogni tre ore, e
finché i dolori non si fossero annullati do-

per prendere l'ammolante ogni ora una tazza di caffè del seguente rimedio.

R^a. Radice d'altre' on. 1. e mezza, frantumata si farà cuocere in sufficiente quantità d'acqua per mezz'ora; alla colatura d'oncie sedici, si aggiunga.

Manna calabresi. onc. 4.

Arcan. duplicat. dram. 8j.

Sciroppo mariano onc. 3. si misceli etc. I dolori cessarono; nella scorsa notte, il sonno fu alquanto disturbato; il corpo si sciolse quattro volte, e le fecce liquide; il ventre era ancor un poco teso.

Essendosi dissipato nel XIII giorno ogni dolore, si continuarono come ieri i rimedi ammollianti, e leggermente purganti. Le feccezioni di corpo furono facili, e poltacee. Perchè adunque l'ammolante d'infusione degli stessi medicamenti per tre o quattro giorni ancora, e per cibo non gli propoli che la panatella, o un brodo di carne con orzo, e delle fette.

Al 17 di Novembre, nel XIV giorno di malattia, ed ottavo di mia cura feci l'ordinazione d'una quant'uncia di sale ancora sciolto in sei oncie d'acqua, da prendersi due once ogni due, o tre ore, quale medicina dovrebbe continuare per molti giorni; per bevande poi il decotto d'adina coll'infuso dei fiori di camomilla.

Nel giorno nove di Dicembre visitando l' inferma non si leggeva di cosa alcuna. L'averuti d'assorgersi in avvenire per quanto fosse possibile dai necessari travagli pavorosi che, e di tenere con ogni cura il corpo aperto. A questo scopo prescrissi delle pillole formate col *japon rapato*, e l'estratto di *Robarbaro*, di cui doveva far uso per un mese ancora.

Trattando io del dolori colici provocati dal Saturno, mi sembra a proposito di aggiungere la storia di un altro malato, la quale è per l'origine che nasce da questo metallo, e per l'indole particolare, merita qui d'aver luogo.

§. 12.

Tumore metastatico nato in ambidue le mammelle d'una ragazza dopo l'uso d'un medicamento saturnino.

Giovanna P. . . nobile d'anni 20, sana di corpo, e d'animo allegro, regolata ne' suoi costumi; nel mese di Novembre dell'anno 1784. fu assalita da una erpete, che coprivasi il dorso, e il corpo d'ambidue le mani con un prurito molesto, e con delle piccole pustole, di cui alcune mandavano una materia purulenta. Il resto del corpo era libero dalle pustole, e dal prurito. Si fece uso de' bagni fatti colle erbe ammollienti alle mani, e internamente si diedero va-

si rimedi per lo spazio di sette settimane, ma inutilmente; alla fine ungendo le parti affette coll'unguento di *fermentum butiri* ed effratto di Saturno per 12 giorni, dissipate le pustole, e l'erpete, rinascendo istante una eruzione di color rosso in ambidue le mani. La regione che si dissipava la serpegine dalle mani, soffriva l'infiammazione prurito maggiore, nato in allora nelle mammelle, accompagnato da un dolor pungente. La mammella sinistra, dopo aver sofferto per lo spazio di sei giorni dell'umor seroso dal suo capezzolo, all'ultimo rifuso. La destra poi, da cui non scesi alcun umore, cominciò ad indurirsi in ogni luogo, e di più nella parte sua esterna si fece livida con delle bolle rubiconde, senza però cagionare eccessivo dolore, fuorchè quello della prurizione che però impediva il moto del braccio, ma era senza febbre.

In tale stato al principio del mese d'Aprile dell'anno 1785, cioè tre settimane dopo l'erpete guarita, venne da me l'ammalata. Io le consigliai dei cataplasmi spediti di mollica di pane bianco, latte e zafferano da applicarsi spesso volte fin la giornata sopra la mammella, la quale si vola di poi nella superficie un poco più molle; la tensione però in essa rimaneva tutt'ora forte. La mamma avrebbe lentamente a tanta grandezza, che metterebbe ostacolo il nutrimento. Si

Il 2

fin

si sarebbe fatto fare brevissimi incisioni sulla parte, se si avesse voluto accordarsi fino ai desideri dell'inferma; imperciocchè alcuni Medici di riputazione credevano quello male, come in allora si credeva, un vero cancro; e costello, che ciascun Chirurgo non troppo esperto, si sarebbe potuto ingannare facilmente della falsa specie di cancro. Finalmente però essendo la superficie in tutta la circonferenza della mammella naturalmente lissa, ed avendo osservato nessuna irregolarità, prominenza, o vasi arteriali varicosi, e di più una donna non molto vecchia, e i dolori non troppo lancinanti, poteva ragionevolmente conchiudere, che quella specie di tumore, tanto che d'altronde orribile, non si dovesse per altro effetto alla classe de' carcinomi.

Sperando che gli umori acri quindi trasportati dall'impetigine ritrocedano, si dovevono dalle mammelle richiamare alla sede antica, ordinaì alla malata di smentare le mani col dactilo emmalleante, e di fregarle nel tempo stesso col sapone; ma il tutto riuscì vano. Dopo sette giorni rigettai i suddetti cataplasmi, e in luogo di questi, applicai in quella parte, dove il tumore era più grande, l'empiastro di diachiloa semplice.

Abbenchè non potai in corso alito scoprire in questa mammella tumore una vera e manifesta fluttuazione, e la nessun modo

ottenere la suppurazione, ciò non essente nel giorno 20 Aprile mi affolli di fare un'incisione profonda di cinque linee nella parte più inferiore, dove non si vedeva livore alcuno, o rossore, quantunque sapelli, che non avrebbe ferrito ad altro, che ad indicare la strada alla natura, per cui potesse quella scaturirsi degli umori cattivi radunatisi in questo luogo. V'erano presenti vari Professori, ai quali dissi, che mi voleva accompagnare a far l'operazione, che forse sotto l'incisione della non sarebbe sorta materia alcuna dalla mammella, ma probabilmente uscirebbe nella notte seguente, o nell'altro giorno; e di fatti accadde, che nel tempo che feci l'apertura non fuirono, che poche gocce di sangue. Uno di questi Professori ingenuamente mi confessò, che non credea curabile questa malattia, e perciò la ragazza dovrebbe soccombere. Medicai la ferita coll'unguento digestivo, e coll'empiegno diachilo.

Nella notte, e nella giornata seguente scesi dalla ferita molta lenie; la vesicula cominciò a vedersi nella parte superiore della mammella, e il dolore diè principio a rendersi più forte nella medesima, e nel braccio. Si vedeva ancora concentrata la gonfiatura della mammella verso il basso.

Al 23 d'Aprile di notte tranciai la piaga dell'umore seroso in gran quantità.

Il 3

malattia.

rischiarato con della marea bianca, e crasse; agli 26 di notte poi nacque un'apertura spontanea lungi due dita dall'incisione fatta da me, da cui partirono saliva dell'umore in copia. Essi per altro maggiore la materia, che sortiva dalla ferita, e mandava un odore di latte acido: la marea però che si trovava affinisce era lodevole. Dopo questa evacuazione il lavoro, ed il calore diminuiscono notabilmente, non meno che lo stesso timore, dolore, e tensione.

Vistando l'infirmità il giorno 28 ritrovo quattro grandi puntelloni ripieni di marea; tanta fa la copia della materia, che fuora.

Qui solamente per la prima volta dopo d'effetti sensibilmente marisanti l'enorme volume della mammella, mi fu permesso di toccare parte per parte, e specialmente nel corpo lenceo della medesima in cui scoprii durezza che prima numeravano nascoste al tatto; quindi preferii di nuovi cataplasmi, che pochi giorni dopo feci sospendere, e perfino di continuare i bagni ancora d'acqua e latte per lo spazio di nove giorni; l'uso del latte dovevosi dall'infirmità continuare per quattro settimane. Sono la pratica di questi rimedi le suddette durezza in 12 giorni svanirono in gran parte, per risolvere le quali poi intermentate, sospeso di nuovo il cataplasma, ordinai il seguente alimento

Re.

8^o Unguento servito onc. 3.

Olio di verbasco onc. 1.

Spirito d'auto de. 1. mischiati.

La piaga sotto l'uso dell'unguento digestivo semplice mandava copiosissime marcie, e la gonfiorella della mammella a poco a poco decrebbe in tal modo, che ella divenne uguale alla foggia di quelle d'una vecchia, in cui si osservavano delle strisce a guisa d'alveolante cicatrici.

Fino al due di Maggio il dolore nella mammella spacci del tutto, egualmente che nel braccio, e la ragazza ricuperò l'antico uso del medesimo. La spontanea apertura della mammella tornò minore, e restò meno profonda non rimandava, che una piccola quantità ancora di marcie lodevoli, finchè dopo cinque giorni si chiuse quasi del tutto. Dalla ferita artificiale non sortiva più marcia alcuna, ma puro siero, e ciò accadeva soltanto, quando si faceva una compressione nei luoghi vicini. Si doveva alleviare le cagioni di tal cosa alla piccola singolarità quivi nata, e per ciò giudicai, che quella venisse tolta colla leggera applicazione della piastra infernale alla parte affetta.

Al 13 di maggio si vedeva ancora un poco di siero misto con un po' di marcia. Quindi dopo il settimo giorno la piaga si coprì quasi affatto da una cicatrice; le donne cre-

DISSERTAZIONE III.

SOPRA

L'ANEURISMA VENOSO

DEL

Fig. D. ANTONIO DE BRAMEILLA.

§. 1.

*Sentenza di Lanfranchi circa l'ammnistia-
zione della canota di fangar.*

Ben a ragione *Lanfranchi* *Milaneſe*, *Ar-
chiatro* (*) *del Re Lodovico* detto il *Santo*
aveva contro quel cattivo uſume, abbrac-
ciato volgarmente ne' ſuoitempi per tutta la
Francia, che permetteva a qualunque prin-

Il 3

ci.

(*) *Chirurgo grande* *Venezia* anno 1561 in *Fel.*

Bellere nella ſua *biblioteca Chirurgical* parlando
di quello celebre *Chirurgo* del *decimo* ſecolo ſcrive
affredar, che la *Chirurgia* *Frangale* è *diviſa* *della*
a *guglia* *grand* *come* *l'imperatore* *la* *para* *opre*
Chirugi *tempo* *nella* *Francia* *della* *Lanfranchi*
per *Anno*

Spigiate di Chirurgia, ed ogni Barbiere, non meno che ad altra gente ignoratissima di *cassar sangue*, operazione, che per i pericoli a cui va soggetta, non dovrebbe essere amministrata che dai soli più esperti Maestri dell' arte. Questo uomo illustre adunque per il suo amore verso il genere umano si era fatto quasi una legge d'intrepidezza egli stesso la febbotomia, se di altre minor circospezione in questa operazione, che nelle altre più intralciate, riconoscendola degna della più seria attenzione, benché dagli ignoranti vilipesa. Imperciocchè offervo da questo fonte nascere molte disgrazie: ebbe a vedere molti che sotto l'operazione soffrirono la lesione o dell' spencord del muscolo detto *hidipite*, o di un nervo, o di una arteria, e per tal mezzo periti furono, per sempre in dell' uso de' membri, e tal volta veniva in seguito la morte stessa, soggiungendo alla fine, che tal sorta di disgrazia sogliono spessissimo arrivare in que' luoghi, dove s'usa questo perverbo costume di lasciare la febbotomia nelle mani degli insperiti.

§. 2.

Pien questa della rarissima esperienza confermata.

E' sorprendente il vedere questi Barbiere esercitare ogni giorno un' operazione del maggior riguardo con una temerità, ed intr-

trasponderla, senza aver mai avuto istruzione scientifica circa l'ottimo metodo di operare, e inoltre allettati dal preconcetto le cognizioni, che sono necessarie per le precauzioni, che l'operazione della clogge e (quel che è peggio) — ignoranti insieme nel modo di impalare, e di trattare quelle malattie, che sogliono accadere nella cavata di sangue, risulata infellicemente.

§. 3.

La conseguenza più frequente della flebotomia fatta con cattivo successo.

E' provato dall' esperienza, che la lesione dell' arteria è una delle più frequenti conseguenze nato dopo la cavata di sangue istituita con cattivo esito, in quale arriva, se, ferita tutta la vena, si caccia profondamente la punta dell' flebotomo nel canale arterioso, che soggiace alla vena. La qual cosa merita tutta l'attenzione, mentre aggrava in aneurisma, con esito non di rado funesto.

§. 4.

Quali notizie offrano gli Arabi ed i Latini dell' aneurisma.

E' noto che quella specie di tumore fu dai Greci, e dagli Arabi divisa in tre qualità, benché non si trovi presso de' medesimi quella chiamata, e quella precisione, di cui si son serviti i Latini nell' esporre tal materia.

ria. La ragione pare consistere nella scarsità delle anatomiche cognizioni, delle quali mancavano, o per l'incosidera venerazione, che avevano per i morti, o perchè venivano loro proibito dalle leggi stesse la sezion de' cadaveri; onde è facil cosa capire perchè confondessero i nervi col tendini, e le vene colle arterie. Che gli Arabi però ammettessero qualche differenza, si manifesta dall'aver distinto un tal tumore col seguente termine: *hyperisina, condorisina, aphorisina* (*). I Greci gli diedero il nome di *Anacarisina*. I Latini adottando l'idea di *suppurare*, (dal Tedesco *Unterlaufsung*) crederono convenirgli propriamente un tal nome. Di poi senza fatica di chiamare col proprio cognome ciascuna specie di questo triplicato tumore, derivandolo dal verbo *ulcerare, corrumpere, e concorrere*. E' sembrato in seguito più comodo di ritenere la denominazione data dai Greci a questa ulcera, come che la più adatta e precisa, e distinguersela in guisa, che ciascuna specie venga fornita d'un addettivo particolare. E' noto, che alcuni autori del secolo passati non seppero chiaramente distinguere l'*anacarisina* dall'*Ecolero-*

fitis.

(*) *De A. Siquino dell' essenza natura degli ulcersi*
Cap. VII, degli ulcersi singolari alla dell' anacarisina.

fi, e che potremo appellare volte l'uro per l'utero. Quest' *ancurysa*, che chiamano *spurio*, se si prende in più stretto senso, non va insieme dell' *occhinosi*; perciò adunque sarà incorrettamente l'adettare un tal nome, perchè non si può nettamente distinguere l' *ancurysa spurio* dalla leggiera *occhinosi*, cagionata dalla rottura de' piccoli vasi cutanei, e delle vene che soggiacciono alla cute, negligenza la quale diffinizione, di conseguenza si perde la vera cognizione di tal malattia. L' *occhinosi* spesse volte è una cosa da poco e nessun momento; ma al contrario l' *ancurysa spurio* costituisce una malattia per se già grave, e ancora più pericolosa in ragione della grandezza dell' apertura, perchè ella riceve continuamente nutrimento da una arteria aperta. Siamo superfluo ragionare d'ogni specie, mentre è abbastanza grande il numero di quelli, che soffrirono in generale dell' *ancurysa*, e che ne trassero del fatale.

§ 5.

Cosa intendano i moderni sotto il nome d' ancurysa venoso.

Abbiamo stabilito soltanto di parlare di quella specie di tumore, che da alcuni vien nominato *ancurysa venoso* o *varicoso* (*),
da

☞ (*) *Monro nelle osservazioni sopra le Malattie p. 31.*

da altri terici aneurismatici (**), entrando specialmente in ciò, che riguarda la cognizione pratica di questa malattia.

§ 6.

I segni caratteristici di questo aneurisma.

Questa infermità vien prodotta allora quando per un infelice accidente d'una carota di sangue si ferisce in un collo vera l'arteria, arrivata la qual cosa, il sangue arterioso s'accelea, ed entra con forti vibrazioni per la vera aperta, quale comunica immediatamente coll'arteria in maniera, che non solo la vera ferita, ma ancora tutte le altre vicine e quelle che a quella si uniscono per anastomosi; giacchè non possono sufficientemente resistere all'impeto del sangue arterioso, perchè le loro membrane sono assai più molli, che quelle delle arterie, che devono soffrir un estensione. Si aggiunga, che il sangue arteriale diffuso nella vera impedisce il libero ritorno del sangue venoso al cuore, per cui ne segue che le vene gonfano le tuniche, specialmente verso le parti inferiori, e alzandosi alla fine diventano varicose, dichiarando patentemente un tale morbo.

• In

—————

(**) Anche nelle non late delusione d. Zur
e alla Firenze luglio 1794 pag. 127.

In primo luogo è da notarsi il volume del tumore, e levato e stato nelle la parte stessa dell'arteria ferita, che mette il sangue nella vena dalla parte opposta; quindi è facile concepire, come in questo luogo vi debba essere una fortissima vibrazione. Finalmente la d'uopo sapere, che in tal tumore è di sua natura già molle, e che suol più agilmente cedere alla pressione del dito, che l'ancurisma il vero, che duro. La ragione del qual fenomeno si spiega senza fatica, giacchè oltre la continua comunicazione della vena coll'arteria sopraggiunta, la sola parte della vena, e gli integumenti costituiscono il sacco del tumore.

† Principio d'argomentazione

Si prova con argomenti essere nuovo il detto tumore.

Quantunque, come abbiamo detto di sopra, si abbia incominciato per la prima volta ad introdurre il costume ne' nostri tempi di chiamare quella specie d'ancurisma, aneurisma varicoso, si può per altro con argomenti esser convinto, che la prima efficacia di quella malattia si dovrebbe offrire al tempo, che si principia a esercitare la flebotomia sopra l'ajuto d'un strumento tagliante ed acuto.

to, Al *Joc d'Analogie Parto* (*) quella malattia non fu riconosciuta a Galieno. Anzi egli soggiunse, che un tale aneurisma nasce dalla lesione dell' arteria, che è unita colla vena. Comunque finalmente sia la cosa, certo è che quella malattia non è nuova, perchè non vogliamo al nome d'ella assolutamente negare la novità. Molti Chirurghi Italiani chiamavano quell' aneurisma *mixto*, comprendendo sempre sotto questo nome quello delle genere, ch'oggi da noi si appella *varicoso*. La ragione di questa denominazione è doppia, primariamente perchè l'arteria, e la vena vengono lesa nel tempo stesso, secondariamente perchè il sangue arteriale si mischia col venoso. Quasi hanno i sentimenti sopra di ciò di Gio. Ant. della Croce (†) celebre Chirurgo Veneziano del xvi. secolo vengono abbastanza dichiarati. Egli dà alla vena, in cui passa lo spirito arteriale, il nome di *vena arteria-*

mixta o *mixta*.

(*) Quando l'arteria è aperta per aneurismi si forma una malattia, detta *aneurisma*, ella nasce allora quando l'arteria è lesa per una piaga, e la vena, che è al di sopra di lei, si mantiene, e la lesa dell'arteria rimane senza altra comparsa, ed allora, si converte all'apparenza di vena per aver aperto nel suo la comunicazione con l'arteria in luogo di una vena. *Libro 1.º*

(†) Chirurgia universale e pratica pag. 392. 394. in Venezia 1770 in 8.º.

fiata (ciò che è lo stesso, che varice aneurismatica); di poi racconta i segni diagnostichi della malattia, anzi propone il medesimo metodo di medicare, che noi stessi adoperiamo, e che si descriverà più a basso; di più asserisce, che questo accortissimo ammette più facilmente la cura, che quello, che il volgo chiama arteriale, e da le ragioni di questo accorta. Anzi leggiamo che già *Fabrizio Hilden* (*) per distinguere gli aneurismi si è servito del nostro termine, mentre queste sono le stesse sue parole «*aneurisma si distinguitur in venosum et arteriosum.*» Pure non essendo il nome quello stesso, di cui propriamente qui si tratta per la descrizione caratteristica della malattia, e per il metodo di cura, giudichiamo piuttosto a tal uopo riportare le seguenti istorie di malattie, formando alle l'elencazione di questa differenza.

1.^a 2.

Prima istoria di questa malattia.

Una donna di 30. anni di temperamento sanguigno-bilioso, gravida da cinque e più mesi nel principio del settimo se afflitta da una peripneumonia; per ordine del Medico

¶

(*) Osservazioni e Lettere pag. 14. Augustana 1713 in 4to.

Si fece una cavità di sangue, per eiegnere la quale il giorno 8. Aprile 1786. fu chiamato un Barbiere, che mediante la lancetta intraprese l'operazione, ferrendosi della mano destra per aprire la vena del braccio sinistro. Nel quarto giorno dopo la cavata visitai l' inferno. Si chiamarono in consiglio il mio Fratello *Proco-Chirurgo* e i Professori *Stoll*, e *Studoir*, quali meco esaminarono il braccio lesò; si fecero delle interrogazioni all' inferno ed esaminati i bistoni, convenimmo tutti, che nel ferire la vena mediana del braccio, fosse esaudito stata fatta l'apertura del muscolo bicipite, ed avess la fella arteria che riceveva una lesione nel luogo distante alcune linee dall'arteria brachiale, per cui il sangue arterioso passando con grand' impeto dall'arteria nella vena si misturasse col sangue venoso. Le pareti superiori della vena, che riguardano gli chierici integramenti restavano si comuni nello spazio di 14. ore si erano già coagulati. Finito co' forte impulso del sangue arterioso le pareti della vena si dilatavano in gola, che cominciò a comparire l'ancuriforme varicoso della grandezza poco meno d'una noce (*). Appressato il dito

al

(*) Nel caso anelato la lancetta ha fatto quattro fori due alla vena qua annessa, e l'altra polente

al tumore era facile il sentir la vibrazione del lingua arteriale, che dava un certo qual senso d'ondulezioni, quali ondulazioni vedevansi scostarsi per il tratto della vena un pollice incirca sopra la cisterna della ferita, e poi al di sotto d'ella in maniera però, che queste diventava più deboli, quanto che l'umor arteriale s'allontanava dal centro del tumore, finchè del tutto a poco a poco scomparivano. Eliminato il polso del braccio affetto nel corpo era molto più piccolo di quello del sano, e levato l'apparecchio della compressione si vedeva menomo a segno, che appena si poteva sentir, tanto poco era il sangue, che veniva cacciato nella parte inferiore dell'arteria.

V'era inoltre una leggiera ecchimosi, che si vedeva distintamente sopra il tumore dell'arteria della grandezza d'un ovo, ed accompagnata da un altro tumore di co-

lor

re, una all'arteria, e l'altra all'arteria. In queste quattro aperture hanno l'eguale distanza, e li corrispondono a vicenda l'una coll'altra il sangue scella dal fiele nel sangue venale. Quando la spugna spreme non loro parallel, oppure se li fa appeso un ottuso, per cui il sangue arteriale non possa passare nella vena, e s'induca nella capsula del cuore de' vasi, e nel sistema circolatorio, forma una spugna di sangue. Negli Istori di Chirurgia T. II. §. 127.

lor nascente, e dolente che si offendeva secondo il decurso del muscolo bicipite; questo preveniva della lesione dell' aponeurosi. I dolori violentissimi nel moto e nella pressione tormentavano l'ingombrata, e del bicipite si propagavano fino alla scapola, e all'ingù scorrevano per la flessura del cubito fino all'apice del dito in modo che il pollice, indice, e medio s'erano tutti rigidi, e privi di qualunque movimento; l'ausiliare poi, e l'antecubito godevano ancora qualche flessione, ed estensione, non liberi per altro strettamente dal dolore.

Al 12. d'Aprile, giorno quarto dopo la lesione fatta, m'accisi alla cura; l'apparato, di cui mi serviva era il seguente; una *fascia circolare* d'otto braccia, cinque *plasmacollati graduati* molte volte addoppiati, un *globetto di filo siccato alla cenola*, e alquanto maggiore del tumore stesso, un *ago*, un *fio*, e dell' *acqua popolare vulnerraria* detta del *Lenzi*.

Feci la medicazione nella seguente maniera. Applicai il globetto di filo siccato bagnato nell'acqua vulnerraria al tumore infiltrandosi, sopra cui misi i cinque *plasmacollati graduati*, di cui i primi due erano imbevuti nella stessa acqua. Tutto ciò non poteva nè allargarsi, nè dimoversi dalla sua sede a motivo della fasciatura (detta da *Chicorgio a Cron di S. Andrea*) circola-

se applicata in guisa, che i cerchi della medesima s'incrociavano strettamente, e varievano da per tutto uguali. Altra fascia larga fasciava tutto il braccio, e s'ordinò all' istessa forma di contenerli in un perfectissimo riposo. Dove sembrava impaccio la fascia menno tela, s'infilava in quella parte del liquet papale, dopo la qual cosa ella s'addattava maggiormente, e rendeva il tutto più fermo. Ciò s'accostumava fare tre volte in 24 ore, ed è già noto che le spruzzate d'acqua vulneraria oltre la fistula produce ano il restringimento del sacco aneurismatico.

Sull' aneurisma si applicavano dei panni quadruplici bagnati nell' acqua vulneraria fredda, mischiata con due parti d'acqua di rose, e il loro uso veniva ripetuto spesso volte fra il giorno. Coll' acqua medesima si dovevano lavare alcune volte nella giornata le parti libere dell' anti-braccio, mediante i quali ajuti sopprime in pochi di il dolore.

Quattro giorni dopo a cagione del dolore, che sopravvenne all' indenne fu obbligato per la prima volta di sciogliere la fascia, e ritrovai il tumore aneurismatico notabilmente diminuito. Ma levato appena tutto l'apparato, se sull' alente non si fosse compreso il tumore, manifestamente, e feb-

to gli occhi si vedevano crescere, ed aumentarsi le oscillazioni del sangue arterioso, le quali figuravano il tratto della vena. Passai sull'istante alla medicazione, che fu eguale a quella della prima volta, e la lasciai cinque giorni sopra il tumore. Nel tempo della lesione si trovavano presenti alcuni Professori dell'Accademia i Sig. Boeding, e Struik, ed il Segretario Sig. D. Schmidt, che meno esaminarono lo stato dell'inferma; anzi se li pregai di dare il loro sentimento; ed essi m'assicurarono, che il metodo di cura intrapreso era ottimo, e il più atto a condurre a felice termine la cura; anzi che non conoscevano mutazione alcuna da farsi. La medicazione si faceva nel modo sopra citato, e veniva in seguito ripetuta ogni otto giorni, ed alla fine ogni 15. Le ultime due medicazioni però erano ingiuste, che ciascuna durava dall' altra tre settimane. In generale convien però sapere, che nel trattare l'inferma ho preso la norma dalle circostanze; e dall'intensità dei dolori ho giudicato impiegare maggiore, o minor tempo nel sciogliere la fiala, e nel fare una nuova fasciatura.

Con questa maniera di procedere costante sempre efferai con grandissimo piacere divenir meno di giorno in giorno vieti il tumore. Nella quinta volta, notando la medicazione poter allontanar, che

la

la ferita dell'arteria era quasi coagulata in guisa, che appena si scorgeva un rictus di sangue arteriale, che spellava; ella un filo che sovraveva per la vena. Ma nella penultima, ed ultima medicazione non si sentiva più cosa alcuna. Alla fine per sola precauzione applicai una compressa, colla ferma colla liscia comune, levata la quale dopo quattro settimane al principio di Ottobre si terminò la cura, che durò in tutto sei mesi circa. E' da notarsi, che subito dall'ultimo scioglimento della fascia il cubito dell'articolo, quantunque con pochissimo moto si elevasse a diprese, aveva una mobilità meno perfetta, che l'altro lato, l'articolazione poi ci dava un sospetto d'atrofia. Ma passate sei settimane, cominciò a ritornare l'antico movimento coll'aspetto e vigore naturali. E' certo che la cura non sarebbe durata sì a lungo, se l'ammalata non fosse stata in questo frattempo sorpresa due volte da peripneumonia, di poi da febbre intermittente, convulsioni, ed altri simili mali, da quali per altro felicemente si ricobbe sotto la cura dell' eccellentissimo Sig. Prof. Stoll.

Superate tutte malattie, per guarire dalle quali era d'uopo di frequenti cavate di sangue, e stare continuamente in letto, per cui l'ammalata aveva le forze debilitate in

gala, che, sebbene fossero insorti dolori spauriti, e avesse sofferto due volte un profluvio d'acqua, alla fine nel decimo mese di gravidanza partorì; e la parte era d'istecoma picciolissima co' capegli meravigliosamente lunghi, la quale per altro in oggi trovai rimasta in force, e assai robusta. Che questo parto realmente appartenga alla classe del *istecoma* sembra evidentemente comprovato.

Pare benchè quella disgrazia sia stata prodotta dalla lancetta, ciò non essente rimane meno certo, e meno confermato, che quella meriti in ogni picciolanza la preferenza al *sebotomo* classico, mentre per cagioni sufficientemente consapevoli si devono la maggior parte degli infortunii a quello, come il più atto a produrre simili lesioni, che a quella. La lancetta anche fare un atteggiamento non meno pericoloso del *sebotomo* classico in quel caso però, che il Chirurgo non abbia appreso il metodo giusto di operare, e non la ferre la vena come si deve, appoggiando leggermente al braccio i due libri dopo aver presa la lancetta col pollice e coll'indice co' quali deve schiacciando ferre la vena; e se manca in allora non s'insolperà l'istecoma, ma l'epemate,

Seconda Istoria.

Nel mese d'Agosto dell' 1778. mio Fratello Proio-Chirurgo ebbe in cura il figlio del Sig. Consigliere Aulico G. dell' età d'anni 14. con un ascessiva varicosa della grandezza d'una nocca, che occupava la purgatura del cabito delico. Venne chiamato per la prima volta nel decimo quarto giorno dopo che fu sorta la vena, e insieme di poi me di offerir l'ammolato nel proseguimento della cura. La sorta all' stesso aveva già formata la cicatrice. Per la moderazione il soldato d'altro non s'era servito, che di quanto fu da noi riportato di sopra, di *sio cioè skinte*, ridotte in globetti, *compresse gradinate*, e di una *sfoglia circolare*. Si applicò in pratica anche l'*acqua vulneraria papale*, anzi conveni nel notare, che questo fu il primo, caso in cui egli sperimentò la virtù sfuggente di quest'acqua. Con detto metodo, e con una dieta offerrita esattamente nello spazio di quattro mesi e mezzo, la cura si condusse a terminare in maniera, che non vi rimase molestia alcuna: E' altresì da rimarcarsi che la piccola ferita dell'enteria si cicatrizzò sì prontamente, e con tal forza, che nell'eliminar quella luogo s'avrebbe potuto offerir sotto il dito un pisello. Del

resto ilfimo qui fopiedino commemorare que-
flo metodo di cura, che riuscì sì felicemen-
te, e che mi fervì di norma nel dirigere la
cura della pietra aneuristica.

§. 12.

Tercia Iftoria.

Nell' anno 1759. la moglie dell' illu-
ftriffimo Sig. Capitano d' Artiglieria Baron de
Bender per la fteffa malattia confide lo ftef-
fo mio Fratello. Quefta avanti tre melfi fofte
fel una curra di fangue nel braccio delfto,
elegita colla mano fteffa, per cui ne ven-
ne in confequenza un aneurifmo varicofa.
La malattia crefceva a fegno, che non ave-
va più luogo la cura radicale, imperocchè
oltre la troppa grandezza della ferita dell'
arteria, e del fuso aneurismatico, le venge
dell' anti-braccio gonfiavano a foggio di
vacci e fenza grandiffima fatica non fi po-
teva falciana la parte ftrittamente per im-
pedire l'ulteriore progreflo della malattia.
Sopra il fuso medefimo s'applicavano del-
le pezze gradatamente, le prime delle
quali fi bagnavano col bianco d'ovo, in
cui v'era fcolto del bolo armeno. Se
lavorati l'apparato per alcuni minuti, il fu-
so crefceva dell' ifteffo, e fi rendevano tan-
to menefle le condiaioni dell' uncor arte-
ria-

rielo contenute nel tratto delle vene varicose, che s'accorgeva facilmente essere quelle stesse, che noi osservammo nella prima ammalata, ma alla più forti. L'apertura fra la vena e l'arteria ed il tumore e le vene varicose era alla più grande che negli altri spezzidini osservati. Il tumore avea la grossezza d'un ovo di gallina. E' necessario sapere che il tumore spontaneamente non aveva aumentato se non subita, nè una più violenta compressione, poichè nascevano sul momento palpazioni di cuore, ed oppresione di petto, accompagnate da deliquio d'animo. Per la qual cosa era necessario che fosse fatta leggermente e lentamente, mediante le compresse e le falce, e accendeva a poco a poco. Le medicazioni si facevano in tal maniera, non rinnovandole cioè, che ogni 15, o 20 giorni. L'ammalata inoltre doveva tenere il braccio quieto e piegato, altrimenti pativa nel medesimo un senso di peso assai incomodo, e dolore. Più volte si propose all' inferma la legatura, come unico, e sicuro rimedio, ma in vano, mentre al solo sentirsi parlare di questa operazione, s'inquietava all'istesso, se venne, che l'ammalata, arrivata all'età di 50 anni e più, molto consumata, divenendo di giorno sempre più magra fu tormentata in questo tempo oltre dell' accennata malattia da diverse altre

infermici. Restò alla fine la malattia lenta, ed avanzata col passo non interrotto, dopo sette anni passò agli eterni riposi in una pervarda dell'Impero, dove si tralasciò qualche tempo senza la sua morte.

† 11.

R i f l e s s i o n i .

Da quella stessa osservazione, e dalle altre considerati si capisce, che la sentenza di quegli Autori, i quali pretendono „che l' *anestesia* venga a vantaggio può esser tollerata lungamente; anzi per tutto il tempo della vita senza notevole pericolo della *anestesia*“ non essere conforme alla verità in maniera da non poter produrre parola in contrario. Del resto non è paradossale, se si assente che una tale *degrada* di *incisione* male la vena, non facendo ad un Chirurgo esperto, ma più facilmente ad un imperito. Convien considerare, che questo ignorando il pericolo, agisce temerariamente; il primo invece, vi mette maggior attenzione per evitare tutti i pericoli, in cui il secondo inconsideratamente vi cade. E mettiamo ancora, che ciò arrivi per sua sventura ad un Chirurgo eccellente nel fare una tale operazione, l'ammalato non guadagna egli abitudine nell' aver patito un nome, molto

infinito nella sua professione, che può rimediare facilmente alle conseguenze? Un bravo Chirurgo, giudicando esser lesa l'arteria della venaosa del sangue, che sotto della ferita molto rubicondo miscchiato con un sangue nerastro, e più crasso, unitamente alle vibrazioni corrispondenti al polso (*); nè per questo si dilata a segno di non sapere quali siano gli opportuni mezzi de' quali conviene servirsi in una tale scaguna. Il metodo di cura in questo caso il più semplice, ed il più sicuro consiste nel levar molto sangue, sopra la qual cosa si prende della carta medicata (**), e ridotta in globetto, e si applica alla ferita; dopo d'aver già unite le labbra della medesima, di poi si sovrappongono dello compresso graduato, e con una fascia larga di sopra già descritta, si ferma il tutto. Medicata in tal maniera la piaga si deve tenere il membro piegato, e in totale quiete per otto o dieci giorni, passati i quali se la

falsa

(*) Se il compresso l'arteria sotto la ferita con un dito, il sangue forte una maggior forza, ed impeto: se sopra cioè più lentamente, e sotto di sotto quanto da la pressione è fatto.

(**) Si usano il medesimo effetto adoperando l'olio di rosmarino, o il lino d'apiro, oppure l'essenza d'una compressa, la cui sia medicata una dentata, e altre cose sopra.

lascia il flegma, si scopre la ferita dell'arteria per lo più congelata; per maggior sicurezza però converrà rinnovar la legatura e lasciare la fascia per altri otto giorni. Accadde alcune volte in mia presenza, che giovani Chirurghi dopo di aver ferita col bisturi elastico la vena, non erano capaci di arrestare il sangue, ignorando essi d'aver lésa l'arteria. Senza che l'arteriale si accorgesse, o sospettasse qualche cosa, feci io stesso la meditazione nel modo esposto di sopra, e condussi a felice termine la cura. Nell'uscir di casa, interrogai un giorno un giovane Chirurgo se si fosse accorto d'aver ferita l'arteria? ed egli ricordandosi sull'istante dei fenomeni, che si manifestarono sotto l'operazione fu sorpreso da timor tale, che poco mancò a non venir meno. Innumerevoli altri esempi di tal natura c'ingegnammo che le lésioni delle arterie, se ne arrestano sotto la curata di sangue, con questo semplice metodo (perchè si pratica da un esperto Chirurgo) si possono rifare con tutta facilità.

§. 15.

R i s u l t a t o.

Da tutto quello, che si è fin qui detto risulta quanto ha necessario essere ben instrui-

to nella vera maniera di cavar sangue; fatta poi una lesione all'arteria, questo contribuisce l'esatta notizia delle lesioni, apertamente lo dimostrano i vantaggi, che si riportano da una fasciatura applicata a tempo, e come si deve; del che si può credere, che quel metodo semplice che noi abbiamo proposto, e per il felice successo di gran lunga superiore a quello, che s'intraprende coll'ajuto di diverse macchine per comprimere l'aneurisma, ciò che per lo più suol riuscire a danno piuttosto degli infermi, che in loro vantaggio. E qualunque siasi Pratico riconosca d'aver veduti ottimi effetti da tale sorta di macchine fabbricate in gesso, che corrispondano perfettamente all'indole, ed alla grandezza dell'aneurisma (*) è facile però osservare, che non puossi concepire la speranza d'un cito successo, se subito da principio della malattia non vi si applichi ciò, che puossi soddisfare pienamente all'in-

di-

(*) Si possono vedere vari Sistemi composti a quella che nell' *Alimentario Chirurgico* Autore del Sig. D. Gio. Alf. de' Bonicelli Tavola 22. fig. 1. e 2. ma del p. 11 si può vedere che per la massima grandezza non possono convenire al tutto, intendendosi, che tra il numero delle e il numero di volte una possa proporzionale grandezza. Il solo delle macchine delineate in quella tavola sono praticate essere perchè non possono essere adoperate, come lo sono le Aquare modellate.

diciatore, che sfugga, cioè l'impedimento dell'ulteriore diffusione dell'tumore; dovendo in ciò, come a tutti è noto, consistere lo scopo principale della medicazione. E' comprovato dall'esperienza che, tali strumenti, che premono, non si possono mai praticare in quel tempo a motivo, che colla sua asprezza eccitano dolori, aumentato di ritemperanza gli altri incomodi, che sotto l'uso dei medicini sono insuperabili.

Vi sono altre specie di strictioni, che alcuni raccomandano mai a proposito nell'anteriflexo vero, perchè quello ha grande ed irrevocabile, mentre per la pressione che fanno vicinissimamente due corpi duri, non da solo viene in conseguenza la gangrena del tumore. Il che riesce tanto più facilmente, quanto che la cura per la troppa turgescenza, è indicata per lo al torrefazione, e alla lacerazione; quindi associandosi la reciproca pressione dello strictione e del tumore, anche che la gangrena non occupi sempre tutto il braccio, e non porti la morte, e però necessario che gli strictioni consenti si compiano. Vi sono molti esempi che comprovano questo. In generale adunque credo, che in ogni caso, in cui la fasciatura fatta come si deve riesce inutile, si tenti di darne l'uso di qualunque altra macchina pressoria. Si aggiunga, che non trovandosi in
pres-

ponno queste macchine oltretutto in ogni luogo, il Chirurgo non può prevedere il caso, in cui questa si rende necessaria; di poi non essendo ciascuno istruitoo adattato a qualunque istruere, e alcune di queste macchine fabbricate molto malamente, porteranno avanti di se i segni dell' arte più vile; ma la tela per far compresse e fasciature si troverà da per tutto. Onde si vede che la Chirurgia potrebbe facilmente far senza di tante qualità di tornolari tutti artificiosamente.

Avanti di por far al discorso, finiremo con venire a ciascun Possessore di Chirurgia quella precauzione, che nell' aneurisma serve; (la colla lascia sia con uno straccio, come sarà più in gusto) si deve prima di tutto fare, *che la ferita dell' arteria sia compressa esattamente, e perfettamente.* Se si scinde la fascia, il globero di filo deve esser serrato in guisa, che sia adattissimo all' arteria aperta. Se nè il sangue arterioso continuamente passando nella vena, non solo sarà d'impedimento „ che le membrane „ della vena e dell' arteria meno elasticamente si coagolino tra di se; ma sarà di più „ che la vena, non potendo cacciare il sangue, come dovrebbe verso il tronco più „ ampio, e quindi scaricarsi, opprressa finalmente dal soverchio peso, col tratto del „ tempo s'innalzerà in vortici, crescendo di

«circonferenza ogni giorno di più.» Che se al contrario la compressione sarà fatta nel dovuto modo in gola, che lubramente da principio non si concedi luogo alcuno all'umor artooso, crescerà all'incirca lentamente, e l'ammolito garantito per l'aspirare da ogni cattiva colleganza, rimarrà sano. (*)

DIS-

(*) Si avrà un gusto legno, che la compressione è ben fatta, quando il pulso del braccio corrispondente ha una certa debolezza, avvertendo che la malattia, è la debolezza del polso, non provenga dall'abbondanza delle forze, ma bensì dall'attacco, che pare il sangue di portarsi alle parti inferiori per la lesione, e compressione superiore.

Le prevenzioni poi si prenderà nel tempo che segue il leggere della testimonianza di Giorgio del Sign. Paul. Hoff.

DISSERTAZIONE IV.

S O F F A

L'UTILITÀ DEL DECOTTO DELLA
CORTECCIA VERDE DELLE NOCI
NEL TRATTARE LE ULCERI,

D E L

SIG. PAOL. HUNCZOVSKY.

1.

*Rimedi diversi messi una volta in uso per
curare le ferite e le ulcere.*

Molti e diversi medicamenti topici furono
dagli antichi decantati tanto nel curare le fe-
rite fatte di recente, che nelle ulcere croni-
che. Dalla diversità poi de' rimedi, alla
sua applicazione cadette la malattia, eviden-
tamente ne risulta, che la natura avesse
operato da se sola quello, che i Chirurghi
aspettarono dai topici applicati, e non di
rado sono stati attribuiti gli ulcers di natura
a que' medicamenti, che piuttosto furono

K 2

in

in lungo la malattia, che abbreviasse. Oltrelutto già Ippocrate, trionfando spessissimo le forze della natura non solo sopra la malattia, ma ancora sopra gli effetti belli d'alcune rimedii applicati malamente.

§ 2.

Sentenza d'alcuni.

A quella di quello grand' uomo fu certamente simile l'opinione di molti Chirurghi circa le forze della natura, che li chiamano medicatrici, e Magatti e Sencuffioni (*) e i loro seguaci collocarono tutta la speranza in esse, specialmente nel trattare le ferite, e le ulcere semplici, credendo, che tutte le ferite semplici potessero essere curate con un sol rimedio, e che perciò in tal caso non si potesse sperare alcun vantaggio dai rimedii applicati, che quello di rilanciare in certa qual modo la ferita contrattione, e l'innato calore nella ferita.

§ 3.

Diverse opinioni del nostro secolo.

Altri al contrario erano di parere, che unicamente la natura potesse operare senza

l'

(*) *Magatti delle cose medicatrici della ferita* Cap. 27.
Sencuffioni Aphorismi generali della cura delle ferite 1712.

l'uso di qualche medicamento; quindi ad ogni ferita, e a ciascuna ulcer destinavano un particolare rimedio, dal che si comprende, che inferendo varie opinioni circa il metodo di curare, cagionava moltissimi ostacoli alla medicazione; e un giovane Chirurgo, che si sforzava di metter in pratica le cognizioni acquistate, spesse volte doveva restar dubbioso, pensando, che non era conveniente allontanarsi dall' uso del rimedio, appropriatosi quasi ad ogni infermità.

§ 4.

L'uso delle polveri raramente giusto.

Appena è credibile nel nostro secolo, dove nelle scuole tutto ciò, che è di dubbio, si suole fuggire per quanto è possibile, e dove le forze della natura con instancabile investigazione si manifestano maggiormente, dove le proprietà naturalmente attribuite ad alcuni farmaci si richiamano prima all' esame, avanti d'essere generalmente accettate; appena dilli è da credersi, che in questi tempi i nostri Chirurghi, che o abusano de' rimedi topici, o concedono nessuna virtù ai medesimi, ma soltanto tutto sperano dalle forze della natura.

Se non avessi osservato trattare le ulcere così diversamente, avrei riputato favoloso il metodo, che in vari luoghi s'è tenuto; alcuni cioè mettevano sopra alcuni ulci

lammende del Barbaro facilmente polverizzato, credendo, che siccome preso internamente purga, così dovrebbe fare lo stesso effetto esternamente; tralasciò in settimana, l'ulcere rimaseva nello stato di prima, e dimostrandosi il Chirurgo non cangiò opinione, finchè non vedendo l'effetto, che s'era immaginato facendo sulla polvere la luntara, per cui l'ulcere si rese un poco più puro, senza che però mettesse la prima sua ragione: questo cangiamento però animò il nostro Chirurgo a raccomandare questo nuovo rimedio in tutte le ulcere impure ed umide, come un infallibile modificante ed efficace. Del resto in generale m'accade d'osservare, che le polveri di radici d'erbe, di resina, semipiù e composte, sparse sopra le ulcere ben di rado ottengono felice successo.

§. 5.

Si afferma che la molteplicità degli unguenti ha prodotto piuttosto del male che bene.

Alcuni ripongono la loro speranza negli unguenti composti, che secondo il loro sentimento sono dotati di una virtù d'eccezione ed efficace, ed essi ne fanno spesso uso, quando è ben indicato il diffeccamento; e avendo talora osservato, che dopo aver adoperato l'unguento composto di *tulia*, *all-lane*, o *verde romo*, l'ulcere s'era coperto d'una crosta, pensarono che per necessità

Tunguento formato d'aglio, cera, resina, alligatore abbruciato, e verde rame si dovell-
le meglio in pratica, come rimedio univer-
sale, senza che possa accadere, che le ul-
cere facili di loro natura a guarirsi diven-
tassero con questo metodo croniche, o ma-
ligna.

§. 6.

*Consequenze dannose degli spiritacoli e so-
luzioni.*

Altri consigliano l'uso delle tinture, e
dei rimedi preparati col Solutio per pro-
movere l'assorbimento delle ulcere; per me-
zzo de quali le piaghe diventano calluse, la
loro superficie si rende arida, e finalmente
il dolore rimane nella circonferenza oltre gli
altri mali, che vi si possono aggiungere.

§. 7.

*Gli impiastri molte volte applicati senza
felice successo.*

Ne tra gli impiastri, che volgarmente
s'adopmano per dissecare le ulcere, mi fa
mai possibile ritrovare uno, che corrispon-
da al fine proposto, specialmente se veni-
va applicato all'ulcere umido, e alquanto
profondo.

‡ 8.

Ipotesi sopra l'azione dei medicamenti ef-
ficienti.

L'Ipotesi circa l'effetto dei rimedi efficienti la più consolidata, e la più verosimile consiste, nel dividere per mezzo di quelli gli orifici de' vasi aperti nella superficie della piaga, e nel fare, che l'umore stilante da quelli venga succhiato, e così facilitare la formazione della cicatrice; quindi spontaneamente ne segue, che tra li rimedi efficienti quello sarà reputato il più sicuro, il quale possieda egualmente doppia virtù, astragente cioè, ed efficiente: imperciocchè si è osservato, che li medicamenti troppo astringenti, e troppo efficienti producono piuttosto del male, che dell' utilità,

‡ 9.

Si prova il vantaggio delle cartocce verdi del
noce.

Nel decotto delle cartocce verdi del noce (*) non solo si ritrovano quelle virtù, ma
in-

(*) Nel suo scrivere le cartocce verdi della noce il dottore aver riguarda, che non s'usa tanto l'altra.

Dopo un anno di continua delicatezza il Signor non ebbe d'acqua il latte la macerazione tre o quattro ore, e di farsi bollire per la spazio di un quarto d'ora. sottoposto il Signor le fece per una

inoltre v'ha luogo un'altra, cioè che l'umore colante dai vasi, e che deve formare la cistrica, si coagula lentamente, poichè fatto l'uso di questo medicamento nascono alcune piccole membrane in guisa d'isole nel mezzo delle grandi ulcere, del tutto simili a quelle pollicole infantiche, che durante l'infiammazione fogliacea produci sulla superficie delle bocciucce de' vasi ripieni, ciò che alla di rado accade osservare nell'applicazione d'altri medicamenti.

Leva nel seguente giorno la membrana comparsa, senza che vi potessi scoprire organizzazione di sorta alcuna, dopo il quarto la potrei scappare senza effusione di lin-

R 3

gna.

to, e li confondi col resto la linfa, ed i particolari d'ambrosia del modello, e li applicano sopra le ulcere. Ristore la le parate di un'ora qualche volta le piaghe, senza aver bisogno di trattare le ulcere.

Questo cura di curare breche d'acqua, secondo gli esperimenti del Sign. Paul Morel due mesi e tre settimane di ulcere acquosi, e la pelle più da una cura cura di ulcere epiteliali.

Alcune cure curate nella sua opera della medicina degli ulcere che un celebre medico legale aveva dato alla sua opera effetto del decano di costante verità delle cure nelle malattie veneree.

Il Sign. Gari di Brindisi molto cura la ulcera dell'ulcera di quelle curate uniformemente al medico nelle malattie veneree in forma di pollice, e da quel tempo cominciò a prender cura un cura di cura, e di cui principale ingrediente erano le cure con un mezzo curato nel mezzo la sua curata.

gio. E' cosa per se chiara, in qual maniera incominciare ad attaccarsi sulla sottoposta superiore dell' ulcere, si vendesse più larga e più crassa, e si unisse con quella della membrana, la quale trae origine dal centro, e diffondendosi verso il margine forma in questo modo la cicatrice.

§ 10.

Enumerazione di casi, in cui vien indicato.

In tutto il tempo, che si fa uso di questo decotto, non e necessario alcun caustico per impedire quelle spugnose escorienze, come si suole ordinariamente rimediare nelle ulcere più grandi, imperciocchè quantunque esse nascono, pochi giorni dopo vanno a finire in una galatina, ed fanno ostacolo alcuno alla formazione della cicatrice. Del resto non conosco altro rimedio;—che si può applicare con lo stesso effetto a certe ulcere umide e larghe. Non è mio pensiero di proporre questo, di cui ora trattai, come universale: anzi possiamo ad accertare i casi, in cui è stato ritrovato senza dubbio utile, e vantaggioso.

1°. Nelle ulcere umide, erpetiche, le quali riconoscono la sua origine da una certa erimonia sita nella cute, e dove non c'è infiammazione alcuna.

2°. Nelle ulcere larghe e flaccide.

3^a. In generale in tutte le ulcere semplici e giunte.

In questi casi cioè si è messo in pratica questo rimedio con ottimo successo, e il Sig. Cav. de Brambilla è stato il primo che mi ha fornito l'occasione di praticare questo semplice rimedio, sotto la cui direzione poi ho incominciato anch'io a farne uso; quindi giova addurre un osservazione del medesimo a tale proposito, come mi è stata comunicata.

§. 11.

Osservazione I. del Sig. Cav. de Brambilla.

Un uomo di 46. anni, d'abito di corpo piuttosto, sano per altro, al principio dell'anno 1777. s'era fatta una leggione ferita nel malleolo interno del piede destro, dalla quale però non poté riaverli, quantunque per lo spazio di tre mesi vi avesse posto sopra un empastro comune. Fu chiamato un Chirurgo civile, il quale solitai all'uso dell'empastro un pezzo di tela bagnata nell'acqua, in cui vi si erano aggiunte alcune gocce d'essenza di Saturno, e nei primi giorni sembrava, che questo rimedio efficace facesse il suo effetto; ma non molto dopo l'ammolito cominciò a sentirsi del prurito nella circonferenza della piaga, e comparvero nel tempo stesso alcune pustole erpetiche. Fu accresciuta di poi la dose dell'

effetto di Saturno; e nello spazio di poche settimane li videro le felle pulite accompagnate da una piccola emorragia, che di giorno in giorno rendevali maggiore.

In questo stato un Medico eccellente lo consigliò a far uso d'acide austerebatiche, e di medicamenti evacuant, e siccome senza sua saputa si continuava il fomento coll'estratto di Saturno, così l'erpete ed il tumore crescevano notabilmente.

Io venni chiamato al principio di Maggio, e trovai il piede, e la coscia gonfi eccessivamente, e ripieni di pustole, che mandavano marcia, ed in alcuni luoghi vi erano croste aderenti alla cute manifestata, coprendo le ulcere, da cui scaturiva la gran quantità una linfa acre viscida, la quale toccando le vicine parti formava altre vesichole, dappoi nascevano nel medesimo sito simili alcuni piaghe; i piagguccioli delli intoppi in questa linfa s'indurivano in griglia, che parevano uccelli. Questa infermità occupava ancora tutta la gamba sinistra, nè poche erano le piaghetto, che quivi si osservavano della medesima specie di marcia, che sembrava essere un altro Goutte; del resto la malattia teneva la sua sede specialmente nel piede destro, il quale non passava in conto alcuno dall'ammalarsi altre dellese a terra, e di continuo veniva sì atrocemente molestato da un prurito insoppor-

tabile, da un calor mordente, che si andava più forte allo sfioramento della mano, e da lunghe vaglie, trache avrebbe più volentieri sofferta l'amputazione della parte, anzi che essere tormentato ulteriormente da tale infermità. Così egli si esprimeva.

Io gli dissi, che avrei procurato di correggere co' medicamenti l'acrimonia del sangue, accagionata da quella malattia, ma che essendo il male molto avanzato, non poteva compenetrarmi, che venisse radicalmente guarito. Del resto non parlava mai di accelerare la cicatrizzazione delle ulcere, senza ch'io non vedessi la natura disposta, anzi per rendere il male più soffribile, mi sforzava di conservare le piaghe filanti, temendo, che se si faceva diversamente; non destralle l'acrimonia, e rendesse il pericolo più grave. Avendo osservato, che le ulcere tutte dall'acrimonia depositata alla cute, si caricano con folli fomenta ammollenti, e che co' rimedi efficaci si prolunga la loro guarigione, e rendendosi d'indole maligna, dovetti ordinar, che si applicassero le stesse fomentazioni alle parti affette, e quindi cadute le croste, il piede sembrava sgonfiarsi. Allora quando si scoprivano le ulcere mi feci alcuni piumacciuoli bagnati nell'acqua distillata di pomi dolci coll'aggiunta del sago di nafsorio acquatico, e un pochetto di Sial bianco, e il malato face-

va internamente ufo per lo fpazio di tre mefi del latte di latte; il vitto doveva confiftere in cacci tenere, fratti, erbe, e radici. Non ancora polla il fecondo mefe l'erpate fpal del tutto, e il tumor del piede divenne minore di due terzi. Tutta la fuperficie rimafe coperta di piccole squame fette sì come diffinili a quelle della pietra trasparsente, (*) ed il prurito era sì fatto molto meno incomodo. Per controllare le squame, che vi reflavano, e per impedire, che non fi accumulaffero di nuovo fono di esse unguenti acuti, fuffraggi ai fomenti, bagni tepidi d'acqua con un po di latte, e l'aceto doveva ogni giorno ufare per mezz'ora, di poi ordinai, che fi fpargelfe fopra il piede, e la gamba la polvere compofta d'occhi di gambero, e Saf bianco, e con quefto metodo in pochi giorni fu rifatto non effendori rimafia che un erpate fuperficiale.

In quefto ftato l'infermo veftì la metà del mefe di Luglio, andò alla campagna, e dopo 15 giorni gendandoli un poco il piede ritornò a calà, l'erpate però nel piede era diminuito un pofo da quello, che effe era allorchè io l'abbandonai, folamente alcune squame divennero più groffe; ed il prurito capionava moleftia maggiore; del refto.

non

(*) Deum vulgamentis dequale

non si osservava più nel corpo alcuna pulsazione. Per attenuare adunque queste sanguinazioni, consiglia i pedilavi composti di decocto di radice d'alta, e dei fiori di verbasco da adoperarsi ogni mattina per quattro giorni, dopo di che cadevano alcune d'esse, ma se ne facevano altri benché leggeri quì e là sulla superficie delle molle cistiche, sopra le quali feci spargere di quando in quando un poco della levissimata polvere. Nel tempo del pedilavio il tumore sempre aumentava, quantunque il calor dell'acqua non eccedesse il grado del calor naturale umano; pure poco dopo il bagno il tumore dissipavasi intieramente, e l'ammalato, legato con una fascia chiodata leggermente il piede, poteva camminare; a questo effetto veniva il modello leggermente schiacciato, acciò non eccedesse la materia morbida, ma soltanto s'impedisse un maggior afflusso d'umori, e non eccitassero le crepature, che erano negli integumenti comuni, imperciocchè queste si mostravano in guisa, che la cute sembrava fosse stata tagliata da un coltello, da cui scaturiva una materia acre, e tenace che essicata rendeva la fascia come se fosse stata incollata.

Credendo, che il vizio della massa del sangue fosse per mezzo del latte, del bagno, da cui veniva in seguito sempre un dolore, che portava fallievo, e dell'elisso

metodo di vivere, di già emendato, giudicai a proposito l'ordinare un fomento, che fosse dotato d'una virtù efficace, e nel tempo stesso potesse correggere quell'anomalia particolare.

Ammaestrato dall'esperienza d'altri ammalati, che i fomenti fatti col decocto delle cortecce verdi di noci egualmente hanno operato nelle ulcere umide suppurative, preferii ancora in questo caso un simile fomento da rinnovarsi ogni giorno cinque o sei volte, allorchè voleva sortire di casa si serviva di una polvere formata d'occhi di gambero, e di cortecce disseccate di noci da spargersi sopra le medesime. Il piede si era sì tenuto bandato, diventava più sottile, e le escoriazioni insensibilmente si disseccavano. Per rinforzare il corpo all'è debole dell'ammalato gli ordinai il seguente elettuario, di cui doveva prendere due o tre dracme per giorno.

R^o Radice di corteccia di noci onc. una

Polvere di corteccia peruviana onc. mezza
m. d.

Le escoriazioni a poco a poco si essicarono, e il piede in un giorno ricuperò il suo colore, e la grossezza naturale, per la qual cosa, abbandonata la fascia raccomandai all' infermo il suo elettuario da continuarsi per lo spazio d'una settimana due volte al giorno. E così l'ammalato è restato intiera-

FINIS.

mento, e alla fine di Settembre non ebbe più bisogno d'altro medicamento.

Al 17. di Dicembre venne richiamato dal medesimo a ragione di una leggera risipola nella faccia accompagnata da febbretta, e dolori di capo. E' incredibile quanto i parenti dell' infermo temessero questo mala accidentato di nuovo, imperciocchè credevano, che la risipola indubitatamente nascesse origina dal piede curato (*): quindi alcuni ave-

VANTO

(*) Non di rado da un alone curato troppo presto nasce la risipola, e sappiamo che questa nasconde in sé facilmente qualunque dolore, convulsivo, liquorale, ipertico, albuginoso, gangrenoso, e tutti insieme. E' necessario allora di ricorrere alla medicina, che viene dall' eccellente Profratino e Marzio Rossi esibita, gelie di la. repubblica.

Quel che vale in aumento di trattamento in caso, che per la sua particolare natura si attenua.

Nel Febbraio dell' anno 1875 venne all' Ospedale Universale una donna di nome d'anni 37 anni, la quale ogni qualvolta andava laggiù si vedeva mordente soffrire dei dolori che ella regimava del piede, quale incomparava per la più, allungando del tutto al termine del suo dolore, tale era la sua speranza da un talora alla parte della gravidanza di una prima di mano, che aveva di tutto condizionale della risipola? La paziente non s' applicava che dei pomate caldi, per cui dei quali non si faceva molto altro volte, che nel frattempo di quella malattia aveva alla di corrente l'ordine, ed anche, o gli amatori di alcuni d'anni, invece di tale fare alla regia del piede, e prendendo dalla parte di capo comparsa la risipola che nasce, quale dopo il suo stato ordinato Profratino, medesimo s' applicava del Profratino di Profratino, medesimo del Medico.

L.

vano propolis un vesicante, qualche altro un lettono, ed altri rimedi. Confesso il vero, che a prima vista ancor io ebbi alquanto, temeva cioè, che la materia non avesse forse fatto già una metastasi. Dovendo sempre indagare l'origine del male, avetti di determinare la malattia, e prendersi l'indicazione; dopo un esame diligente mi fu finalmente risorto, che il malato da molti anni soffriva la risipola nel piede, e che tutti i suoi Figli dopo essendo dello stesso temperamento del Padre, venivano anch'essi spesso volte attaccati in forza della risipola, idea che però avellero mai sofferto pustole nel piedi, o in altra parte del corpo; da ciò conghietturai, che questa famiglia inclinava alla risipola, e che nullam della medicina, come che di costituzione di corpo haecollematica, potea sopportare alla parte un rimedio preparato di piaguetine, o d'altra materia, che feriva o otturava i pori cutanei. Questa risipola aveva cagionato bensì un poco di gonfiore, ma non era seguita nè da vesiche, nè da pustole miliumi, nè da flemmone; e perciò stimai conveniente, che si abbandonasse alla natura la guarigione, e preferissi soltanto, che l'asfermo, per promuovere la traspirazione, dovesse rimanere in letto, osservasse una regola esatta di vitto, e fosse alle d'una milana antilogistica, dopo di che la risipola, che aveva occupa-

in tutta la faccia, scomparve interamente il giorno sei di Gennaio. Il piede, quantunque fosse la parte del corpo la più debole, e gli umori fossero accostumati a concentrarsi per lo spazio d'un anno e più, rimase senza il menomo gonfiamento.

§. 12.

Osservazione II. dell' Autore.

Un uomo di 33. anni, non mai soggetto a molarmi di forte alcuna, venne affetto da un tumore nel calcagno del piede sinistro, dolente, che si estendeva alla sopra la metà della pianta del medesimo. Abbenchè il dolore non cessasse, non si osservava però ne' primi giorni nel tumore alcuna rottura, finchè otto giorni dopo si fece così e si vide certe vescichette, parte delle quali si aprirono spontaneamente, parte per mezzo del Chirurgo che fu sopraffiammato. Fin qui l'annullato di nessun altro medicamento fece uso, che del miele, quale applicò sopra tutto il tumore per secondare il parere de' suoi Amici. Il Chirurgo sostituì a questo l'unguento comune di Cerussa, e mise sopra il tumore dei pannicelli bagnati nell' acqua, dove v'era liscio dell' estratto di Senna (*).

L. 2

Al-

(*) Per sapere, quali sieno i castori oleosi, che producano quella resina castorea leggevo l'*Antiquité*

Alcuni giorni dopo s'affiancò il tumore in tutta la sua circonferenza, anzi il rigonfiamento in molti luoghi; per consiglio d'altro Chirurgo adoperò dei cataplasmi di polve, e le ulcere, che sembravano impure si medicavano coll'unguento balsamico. In allora per la prima volta fu sospeso l'ammalato da febbre sintomatica, la quale però cedette con remedi leggermente purganti, e pochi giorni dopo, che il dolor fiero, scomparì affatto.

Pochi dieci giorni si abbandonarono i cataplasmi di polve, e le ulcere, che occupavano di già tutto il tumore si medicavano coll'unguento di Strace, e questo metodo non solo contribuiva alla guarigione, ma si affievolivano le ulcere loro più maligne; i loro margini d'irruo induriti, e il Chirurgo comprimendo fortemente il tumore credeva poter evacuare l'umor acreo che si trovava nel fondo del medesimo. Trascurato sì fu mai, senza che l'ammalato fosse in stato di fare un passo; ed essendo stato lo chiamato in Ottobre dell' 1796, ritrovai le ulcere erpetiche, e il tumore nel calceagno, specialmente nella pianta del piede, non molto grande, ma che al toccarlo doveva leggermente. Quindi ordinai, che si fomentasse il piede replicatamente con dei bagni d'erbe ammollienti, e si medicassero le ulcere con un linimento composto d'aglio di mandorle,

* *

e quello d'oro, dopo di che, anzi si separassero quelle due croste, e si rendessero le piaghe sensibilmente alquanto pure, incominciò applicar sopra di esse, purgato da prima l'ammollato, il decocto di cortecce di noci; si cancellò talmente le ulcere in otto giorni, che ne rimasì scoperto, mentre alcune di esse si vedevano già coperti di cicatrici.

Formando queste ulcere una piaga notabile già risolli di fare l'esperimento, se si doveva attribuire la cura veramente a questo rimedio, o agli ammollenti applicati da prima. Per otto giorni adunque mediana la metà parte dell'ulcere con l'unguento digestivo, e l'altra coll'ammollente decocto, e rimossi, che le piaghe, sopra cui fu applicato il decocto, si coprivano di giorno in giorno vieppiù di cicatrici, e che succedeva il contrario in quelle, che venivano trattate coll'unguento; anzi che in quelle non si scorgeva miglioramento alcuno, quali per altro alla fine coll'uso dell'ammollente decocto cominciavano ad uscir, ed il malato in breve spazio di tempo si risolli perfettamente.

§. 13.

Osservazione III. del Sig. Prof. Stöcking.

Un uomo di 34 anni da lungo tempo era affetto molestato da ulcere in ambidue i

L. 3

pie-

piedi, le quali benchè nate da leggeri cagioni, pare a motivo di molte variè, venivano lentamente curate. Questa malattia era ereditaria. Nel mese di Dicembre dell' anno 1780 fece chiamare il Sig. Prof. Böcking per far curare una piaga impura prodotta da un colpo ricevuto una volta nel piede sinistro sopra il malleolo interno. Egli aveva fatto uso di vari rimedi, altre volte giovevoli, ma senza effetto. Avendo osservato l'acerrimo Sig. Prof., che i margini dell' ulcera profonda e molto grande cominciavano a guastarsi, adoperò dei medicamenti convenienti al caso, ma questi pare inutilmente; all' ultimo passo all' uso del decotto di cortecchia di aceri verdi con tale felice successo, che dopo tre settimane ne seguì la consolidazione della piaga.

§. 14.

Osservazione II^a dell' Autore.

Nell' anno 1786 nel mese di Novembre una donna di 63 anni era tormentata da ulcere nel piede, le quali ragionavano dolosi fortè. Questa malattia esigeva la sua cura da un tumore dolente nel medesimo luogo, il quale obbligò l'ammalata a dimorare in letto. Questo tumore cresceva giornalmente, e alla fine degenerò in ulcri grandi, che si elevavano sempre più da cui la misera per lo spazio d'un anno intero

veniva martirizzata. Non tanto per la speranza di recuperare la salute, di cui già disperava, che per cercare qualche mezzo di mitigare il dolore, che di continuo cresceva, volle, che io andassi da lei. Visitandola la prima volta aveva il petto calco, gran febbre, e convulsioni per tutto il corpo, specialmente nel piede affetto. Eliminando il piede trocui ulceri al di sopra, e al di sotto d'ambidue i malleoli lunghe tre pollici, larghe due, assai profonde, i di cui margini erano alquanto rotti: sopra l'articolazione della 5. leorgevano alcune ulceri minori, ma però così alte, che comparivano a nudo gli interstizj de' tendini. Sortiva da tutte queste ulceri una sanie acquosa. Per sedare il dolore, di cui tanto lagnavasi l'inferma, ordinai, che sopra tutto il piede si mettesse un cataplasma emmolliente composto di polve, e d'un poco d'erba di giusquiamo, e nel tempo stesso prescrissi un lavaggio col Lardone liquido da prendersi in varie sicc. Il dolore cessò: nel giorno seguente le diedi un legger purgante, meditai le ulceri con dell' unguento digestivo, e aglio di verbasco, e consigliai di continuare l'uso del medesimo cataplasma. Il dolore divenne ancor più forte, e l'ammalata senza aver presa l'emulsione, dormì tutta la notte, quando che nelle notti antecedenti per lo spazio di molti mesi non aveva potuto chiuder occhio.

L. 4

Do-

Dopo il terzo giorno però ritornò il dolore, aumentò molto per sorte di prurito; prescrissi per la seconda volta l'emulsione, e sulle ulcere applicai il decotto di corteccia verde di noci, e sopra poi di nuovo un cataplasma: in quella maniera ottinsi, che il dolore si dissimulò notabilmente, e nel quarto giorno infatti cessò interamente. Nel quinto abbandonai il cataplasma; internamente non le furono date medicine; il piede poi si fomentava col solo decotto di cortecce, il che veniva rinnovato due volte al giorno.

Nello spazio di tre settimane le ulcere diminsuirono, e formazione delle cicatrici profonde, anzi poteva la malata di già far fuori del letto. Al finir della quarta settimana si unirono le piccole piaghetto nel tasto, e le maggiori, che erano collocate sopra il mal-telo, erano vicine alla consolidazione. Al terminer poi della festa tutte le ulcere guarirono ottimamente.

§ 15. Osservazione V. dell' Autore.

Nello stesso tempo fui chiamato da un'altra donna qual della medesima età, la quale da alcuni mesi portava al piede destro delle ulcere grandi, molto dolenti per la giuntura, in cui usciva in gran copia dell'urina acquosa. Quantunque avesse fin qui l'infir-

mità.

ma adoperato varj rimedi, ciò non ostante però i dolori si rivedevano ogni giorno più veementi, e le ulcere occupavano maggiore spazio. Per calmare i dolori, i quali si erano insuperiti per l'applicazione di un nuovo rimedio, non so da che consiglio, posi sopra le ulcere un cataplasma emolliente, e ordinai all'ammalata un emulsione con alcune gocce di Laudano liquido, e ciò non ottenne effetto. Nel terzo giorno medicali le ulcere col decotto di cortecce di noci, per mezzo di cui si rivedevano più pure, e i dolori frazionarono del tutto. Dopo alcuni giorni cominciarono a formarsi nei margini delle piaghe le cicatrici; nelle più grandi poi si rivedevano già e là nascere delle isole composte della suddetta membrana, le quali a poco a poco si annerano insensibilmente, e producevano una cicatrice soda, e alquanto più profonda. Una sol ulcera tra quelle rimase aperta nel suo mezzo alla grandezza d'un pisello, che mandava però pochissima marcia. Non rimasi a proposito di consolidare neppure presso quella piaghetta credendo, che essa potesse servire di fonticolo specialmente in una donna vecchia soggetta sempre a dolori di testa, e ad altri incomodi; ma questa pure rendevassi sensibilmente più secca, finchè alla fine si saziò: la donna ora gode perfetta salute.

§. 16.

Osservazione VI. dell' Autore.

Nacque ad un soldato di 45 anni, d'aspetto sanissimo, un ulcere nella tibia sinistra senza conoscerne la ragione, la quale subito da principio si fece dolorosa, e così presto s'irreggiò, che nell'intervallo di pochi giorni divenne lunga sei pollici, e larga un. Quasi dopo d'aver adoperato istantaneamente vari rimedi si portò allo Spedale dato eretto dalla clemenza di Cesare per il bene de' suoi soldati. Ritrovai l'osso della tibia, nel cui centro s'insediava l'ulcere, sendo alla larghezza di due dita circa, e lungo poco più, la piaga poi irregolare, la quale aveva i margini gonfi. L'infermo soffriva estrema molestia da quattro settimane in tal' stato. Gli diedi subito un purgante, e applicai per alcuni giorni alla parte affetta l'unguento digestivo: sedotti il dolore, ma l'ulcere rimase ancor forida; perciò unguento l'ulcerem coll'unguento digestivo mischiato coll'unguento di Stasaco, e così rendevasi più pura. Per molto tempo continuò la piaga nel medesimo stato, nel qual tempo preferissi spesso volte dei rimedi eremitici, e prendeva continuamente un decocto purificante. Finalmente feci uso del decocto di coriacea, e in pochi giorni non senza stupore osservai nascere la carne, coprirsi l'osso

an-

medo, particolarmente ferma che precedesse la menzura esfoliazione. In dieci giorni formati nell' ossa della tibia, che s'era appena coperta di carne, la cicatrice, la quale acquistò solidità in tutti i luoghi dell' ulcere. Fattanto la cicatrice si formava generalmente nel suo accennato di sopra; e in alcuni luoghi soltanto, dove era nata lentamente la separazione degli integumenti degenerati producea dall' uso dell' assillotto decotto, feci applicare per qualche tempo l'unguento digestivo, e all' ultimo poi si medicava tutta la parte affetta col medesimo decotto, e con un cinto assillotto (*).

§. 17.

Osservazione VII. dell' Autore.

Un uomo di mezza età portava da 10 anni un tumore adiposo assai grande nella regione lombare del lato destro, che premessa la legatura, levai col coltello. L'ulcere di figura quasi ovale, il di cui massimo diametro, eguagliava la larghezza di 10 pollici m.

(*) Un fascio della br. vedeva la parte parca nel fianco della delle lipodide, e canali laterali dell' osso ulcero di quello decotto.

incisa, reata sull'istante se' primi giorni medicata col decotto di cortice di ucci. Ho potuto osservare chiaramente, che la suppurazione era di gran lunga migliore, e più moderata, di quello che solal accadeva adoperando i consueti rimedi; la cicatrice s'aumentava maggiormente di giorno in giorno; e quantunque non si abbia nullo in pratica altro rimedio, pure nello spazio di una settimana si condusse la cura a felice termine.

Potei raccontare per lo meno tanti e più casi, dove adoperai con alto affai fortunato questo decotto nelle ulcere epatiche, floccide, e grandi, in cui i soliti rimedi non giovarono, e dove gli unguenti, e gli altri medicamenti piugli aumentavano i dolori e la malattia.

Mi sembra già d'aver perorato il vantaggio di questo rimedio, in ciò che riguarda l'effetto sicuro; resta ancora di esaminare i comodi, per cui mi persuado doverlo preferir a tutti gli altri, benchè godano eguale virtù.

Quantunque si adoperi rarissima cura, e grande attenzione, non le fibre degli ammalati sono palite, e proprie, e l'aria si continuamente libera, non pertanto si può pervenire a quello scopo, se non si allontanano nel tempo stesso le cagioni delle notevoli elazioni. La gran quantità degli un-

genti necessari negli Spedali Chirurgici per curare le ulcere, e la loro varietà sono altrettanto largenti, da dove abbondantemente proviene un aria infetta, e ben di rado si arriva a poterla correggere. Il calore non meno che la flogosità de' umori piagati, che di quegli elarori buon odore mischiati colla materia purulenta producono nelle fange degli ammalati dei vapori ingrossi, che difficilmente sopra desinare, i quali concorrono a contaminare l'aria, che d' altronde è già inclinata a corrompersi. Per questa ragione adunque il nostro rimedio merita un particolare essentio sopra gli altri; imperocchè non manda alcun odore nelle fange, nè è tampoco da temersi alcun ingrossamento, che possa contribuire a viziare l'aria.

Negli Spedali Cesarei militari, in cui è stato introdotto (e ciò ha detto a eterna lode dell'ottimo, e sempre celebre Restauratore della Chirurgia) a pro de' fidati ammalati un metodo semplice di medicare le ulcere, certamente non vi sarebbe motivo da temere, che quivi si guastasse per quella ragione l'aria, perchè alcuni Chirurgi d'altronde esperti nella loro scienza, volevano abbondantemente tener opinione ricevuta per l'avanti, i quali volendo affogettarsi al tempo, fingono qualche volta di voler lasciare l'antica loro metodo, ma non la libera oc-

azione, ritornano di nuovo al loro antico costume.

Finalmente negli Spedali ottimamente regolati non solo si deve aver di mira la qualità del medicamento, ma anche il loro prezzo. Quindi è dover del Chirurgo, che tra i rimedi dotati della stessa virtù, si debbano scegliere quelli, che sono di minor prezzo. Essendo adunque il decotto delle cornicelle di noci verdi un rimedio, che, e per l'efficacia, e per il leggerissimo prezzo merita la preferenza ad ogni altro, non si può abbastanza lodarlo nei casi sopra accennati.

DISSERTAZIONE V.

S O F F A

L'OSTINATEZZA DELLE ULCERE
VENEREÆ COMPLICATE COLL'
ACRIMONIA SCABROSA

D E L

SEN. PEAR. GUGLIELMO DÖCKING.

† 1.

Oggetto di questa Dissertazione.

Sembra accettato universalmente, che una certa determinata specie di malattie possa essere trattata vantaggiosamente con lo stesso metodo, purchè sia comprovato dall'esperienza. Non v'è Medico erudito, che dubiti di questa asserzione; pure ci sembra, che non la sia fin' ora esaminata. Mosso da tale riflesso non illudasi inutile l'addurre qui alcune osservazioni, le quali provano, che in alcune occorrenze lo stesso metodo non può

può convenire, ed è lecito scolar dalle regole generali.

§ 2. *

L'osservazione d'alcuni ulcersi.

Le osservazioni fatte sopra i buboni suppurati, e sopra altro genere d'ulcersi, cioè su di quelle, che traggono origine da lesi venerea, formeranno la base del mio argomento.

C'è sopra la quotidiana esperienza, e ciascun Chirurgo, che abbia a trattare in qualche Spedale simili ammalati, confesserà di buon grado, che alcune ulcersi veneree ammazzeranno facilmente la cura, come osservai nel nostro Spedale; ma che altre sono così ribelli a qualunque ottimo rimedio, che non solo deludono tutta l'industria del chirurgo, ma ancora abbattano l'animo dell'infermo.

§ 3

Definizione delle caviglie.

A tutti è noto, e particolarmente a que' Chirurghi, i quali sono bene instruiti ne' veri principj della loro arte, e che agiscono a norma dei medesimi, che talvolta si nasconde la vera cagione in tale guisa, che non da lungo neppure per cognizione si scopre l'origine del mal presente. Obbligato
del

del curante è l'impegnarsi ad indagarne più a fondo la natura del male nascosto. Ma in questo bello accidente s'incontrano delle difficoltà più forti di quello, che non si crede. La varietà delle cause, e l'ambiguità de' segni molto difficili, ingannano tal'ora, e non di rado l'uomo il più esercitato in quest'arte.

§ 4.

Divisione delle cause.

Le cause a mio credere, per cui le affezioni nascono per lo più risultano il metodo comune di medicare, si possono commodamente dividere in due classi; in una, che abbraccia le *causae*, e nell'altra che riguarda le *species*.

§ 5.

Causae causae.

Tra le prime annovero tutte le acritumini, le quali generate nel corpo e acquistate, formano una diavola unione col veleno venereo, per cui nasce una certa specie di malattia del tutto particolare, e composta, che non si lascia vincere colle stesse medicine di cura, quale converrebbe nel male non complicato. Quivi ancora potrà esser una facilmente conosciuta, che l'infirmità divenga sempre peggiore quando il cor-
pi

po dell' animalato per causa venerea si dissolse nel medesimo tempo cachetico.

Ora m' è accaduto osservare tale cosa spessissimo tra i soldati. La loro norma di vivere, le pubbliche case, i loro alloggi specialmente in tempo d'inverno molto riscaldati, e perciò terribili per le umide, e calde esalazioni degli uomini stessi, contempiono gli umori, e suscitano particolari sciermorie. Riflettendo a tutto ciò non è difficile spiegarli perchè in simili casi il metodo comune antivenereo non solo produce l'effetto, ma di più aumenta il male, e lo rende veramente maligno. Si aggiunga che il mercurio stesso, come rimedi dall' alipertema convinto, data più a lungo, e senza regola dilagante con grandissima forza gli umori, e per tal ragione ripugna alle sue proprie forme medicative.

§ 6.

Cause topiche.

All' altra classe delle cause topiche le quali sono d'ostacolo alla guarigione si debbono riferire alla carne, che soverchiamente cresce, le ulcere fungose (ipertrofiche) le callosità, le fistole, e molte altre consimili conseguenze.

§ 7.

§ 7.

Effetto delle scariche nella cura delle ulcere veneree.

Sebbene dall' estesa cognizione di ciascuna delle dette cause, dal discernimento, e dalla convenientemente cura dipenda l' esito felice che desidera il Medico, non la salute dell' ammalato; pure qui non v' ha luogo ad un ampio discorso: ne posso esporre perfettamente ciascuna ragione, ne trattare tutta la materia secondo merita. Mi basterà considerare le ulcere veneree come formate da un' erisipela straziata. Tali accidenti ho potuto vedere di frequente, e meco offerro il caso. Siff., uomo degno di fede: Ecco ciò di ciò le disse per parole (*). Quando le ulcere veneree resistono più lungo tempo all' attuale metodo di cura, di quello che sembra indicare l' apparente condizione delle medesime, specialmente se non vedono al mercurio stesso adoperato in ogni maniera, potremo sospettare, che oltre al vizio venereo si esista ancora nel corpo dell' infermo un' altra malattia, per cui quella, corroborata le forze colla causa venerea, dà origine all' ulcere pustuloso; che se poi, (continua l' Autore) ci riesce per buona sorte di conoscere la natura del-

M. 2

la

(*) Siff. Informazione sopra le altre pag. 166.

„ la malattia complicata, conviene dar subito
 „ to di piglio ai rimedi indicati per correg-
 „ gere l'acrimonia congiunta colla infrazio-
 „ ne venerea. Con quello metodo ne segua-
 „ ra il felice risanamento delle ulcere. »

Quel che ciascuno stenterà bene con giudicio questa materia, e faccia conoscere all'Inglese Chirurgo Douglas esser falsa la proposizione in cui dice „ che le ulcere veneree „ che resistono al mercurio salutato per lo „ più dalla cura. » Giustamente adunque lo riprende il celeb. Richers (*).

§. 8.

La complicazione dell' acrimonia scabbiosa colla venerea, e la frequenza di questa complicazione presso i soldati.

Tra tutte le specie d'acrimonia, che sogliono combinarsi colla sifide, nessun' altra nei nostri Paesi infetta nel medesimo tempo i soldati attaccati dalla lue, che la scabbia; ciò potrei rimarcare di frequenti nella mia pratica. E questa è la ragione, per cui singolarmente nel suo proposito d'indagare più al di dentro la natura di questa complicazione, tanto più volentieri, perchè nella sua Aut. ch'io sappia fino ad ora ha trattato quella materia.

Re-

(*) *Recherches chirurg. Vol. VI. part. I. pag. 91.*

Braverai poi che si chiamasse finalmente la mia opinione la di ciò, imperocchè parlando io dell'ostinazione di alcuni medici veneri, non vorei intender altro, che quello a cui si accoppia l'acrimonia scabbiosa, che si è, antipodicamente nascosta nel corpo. Questa condizione adunque è molto necessaria, perchè la scabbie sia veramente precedente; non nata dal fornito venero, nè che il suo seme sia ancor del tutto estinto; o almeno che l'inferno nel tempo stesso dell'infusione venera accidentalmente abbia anche contratta la vera scabbie. Come poi si debba distinguere la vera scabbie dalla istima, più chiaramente lo dirò nella ~~se~~ ^{se} riflessi.

† ‡
*Impedimenti di questa complicazione nel
metodo di medicare, e la confutazione
d'un'opinione opposta.*

E già disse, che la scabbie associata alla sua celvica forma una larga sorgente di pessimi effetti, ciò che in certi casi è facile osservarsi dal Medico e dal Chirurgo: tanto più gravemente sembra si sia errato fino ai nostri tempi, quanto che si credeva, che il Mercurio fosse in ambedue le acrimonie venera, e scabbiosa un efficace rimedio. E infatti trova questa ragione principale d'una tale opinione, mentre uomini d'altre co-

lebei nella professione Medico, Chirurgo trattarono egualmente, e descrissero colla maggior chiarezza altre complicazioni p.e. di fibrosità, di labe venerea, ma nessuno diffusamente o per accidente fece menzione di questo, di cui noi parliamo.

Che in questa opinione molto errasse, già la dichiara tale da lungo tempo *Linnaeus*, e c'è una pratica apertissima l'avrebbe posta, riconoscendo come una cosa di gran momento. *Molin*, delle egli (*) si trovano ancora, che danno internamente il mercurio nella scabbia, reputandolo un rimedio efficacissimo; ma nella altra specie di scabbia non sembra poter farci coll'acerrimo medicamento, che quella d'indole venerea.

§. 10.

La presunta, e la difficoltà della diagnosi.

Nell'azidemia complicata, la cognizione della malattia produce una forma difficile; la maniera cioè di poter determinare certamente, che tra tutte le possibili complicazioni di azidemia, che si uniscono alla fibrina, la scabbia sia quella, che s'è combinata colla venerea nell'inferno presente.

I

(*) *Compendio di medicina*. Tom. Edinur. Tom. II. 248-249.

I mali, che vengono in seguito alle unzioni premature, sono complessivi: si notta cioè la cute, le tracce della scabbie sparite, no interamente; ma le fosse del malum fronzuto dalla superficie della cute non vengono scervate, anzi ritoccedono nella massa del sangue, e si portano con maggior forza alle viscere.

Spesse volte niente si trova nel corpo dell' inferno, da cui sospettare la presenza d' un altra acrimonia nascosa; se vogliamli indagare la natura delle ulcersi non da queste acrimonia combinate, mancano i segni certi, complicati, propri a questa acrimonia: tutti sono equivochi, e convergono tanto all' una, che all' altra, e anche alla terza acrimonia. E' certo adunque, che nel formare la diagnosi si incontrano moltissimi ostacoli.

Forse mi crederai, e talora pratica specialmente militare mi dovrebbe esser molto grato, se io potessi indicare i segni, per cui evidentemente si deduce l' occulta presenza della scabbia. Ma non lo posso offrire. Alcuni segni però, quali sono accenti, netti, e quali scoppi nelle ulcersi scabbiose, sogliono, se io non m' abbaglio, comparir anche in altre specie d' ulcersi. Qui dovetti offrire le ulcersi fardide, coperte di mudo tendente al giallognolo, lardacee, la mancanza d' un pus lodevole; la copia d' una mancia corrodiva, la superficie larga; le ero-

local spessissimo profonde; i margini conformati, e al più leggero contatto fallasi sangue.

§. 11.

La Diagnosi si deve cercare in massima parte dalla storia.

Ciò, che può dar qualche lume in queste inferenze di cose, è l'intera diuturnità dello stato primitivamente sano, avuto insieme il riguardo alla malattia presente, e al metodo di medicare: quindi a evidenze la necessità dell'abuso, il quale da se solo può bastare nel considerare talvolta la malattia. Quando adunque occorrono delle vicri ne' venuti, che portano avanti di se uno, o anche più segni visibili occorrono di sopra, alori, che fuor di modo, ed ostinatamente resistono alle forze del mercurio, o d'altro medicamento lodati in simili casi, le quali oltre il termine della guarigione non solo rimangono ribelli, e non si deprimono, ma piuttosto costraggono di giorno in giorno peggioré aspetto; di più eccitando esse in giusto sospetto che nel corpo nasca o laggiù qualche viscido di materia lubrificata vera non varcata, poco si soppressa, o non corretta; finalmente essendo prive di segni di sciolto, sia posteriori, sia primitivi, in allora senza il menomo pericolo d'incorrer si dovrà attribuire l'ostinazione delle selle vicri, e la

MA-

malignità alle reliquie della scabbie, ed allora direi che dai segni antecedenti concepiti per mezzo dei lini dobbiamo addurre un giudizio indebitato.

§. 12.

Una particolare annotazione.

Una singolare osservazione, ch' io ho fatta, merita d' esser qui accettata. Nell' esame accurato dell' ulcere non di rado si trova sotto il medesimo un tumore duro, aderente più profondamente al pericardio adiposo, più largamente circoscritto nella periferia, che l' ulcere stessa, più e meno dolente, secondo il maggior o minor grado d' infiammazione, che vi si era aggiunto.

Questo è quel caso, che finora opportuno premettere intorno all' argomento presente. Da quanto si' ora d' essi seguono alcuni corollari pratici; - ciascuna intelligente parte dall' ingegno avrà potuto spontaneamente trar di conseguenza, e parte da ciò, che resta a dir, potrà facilmente capire, che ho ripetute cioè alcune osservazioni, che l' occasione mi somministrava di fare sopra le ulcere di questo genere, le quali m' insegnano, che queste ulcere da principio ribelli ad ogni medicamento anche per lungo tempo sperimentato, finalmente conquistate la ragione della dovuta malignità hanno obbedito al semplicissimo metodo di medicam.

Osservazione I.

Antonio Weiss soldato d'Infanteria del Reggimento Ferdinando Toscana il giorno tre di Luglio fu trasportato nel nostro Spedale avendo alcune ulcere venute al petto, e con un bubone inguinale.

Permettendo per alcuni giorni il metodo antilossifico, senza dilazioni valli aperte col ferro il bubone, che era assai maturo, e lo medicai coll'unguento digestivo semplice adoperando nel tempo stesso per le ulcere del petto l'unguento misto (*) da noi usato.

Appena cessava l'infiammazione, si abbandonarono gli antilossifici.

Per lo scopo di curare la lue, ordinai all' infermo le pillole mercuriali (**) da prendersene ogni giorno tre la mattina, e tre la sera. Oltre di queste il decotto for-

ma-

(*) Un Unguento Italiano con una
Mistura propria coll'aceto rosa
si usava e si fece l'unguento.

(**) Era Mercurio con zucchero con vino
Cinque atomi di polvere con acqua
si pestava nel mortaio con l'q. d'acqua
distillata si riduceva al consistenza la mercuriale, indi
si aggiungeva
Mellaga di pino bianco con zucchero,
si facevano delle pillole di tre grani, con-
servandosi di polvere di Zappalana.

maco dalle solite specie peribonati (*) doveva servire di bevanda ordinaria.

Questo metodo continuato per xiv. giorni non produsse alcun buon effetto. Si cresceva di poi la dose delle pillole al numero di cinque mattina e dopo pranzo, e il bubbone, e l'ulcera del seno si medicavano coll'aria sottratta unguento misto, interponendo, come sempre sogliono fare nei venatici ogni x. o xii. giorni un purgante. E così passarono altri xiv. giorni senza indizio di miglioramento, rimase cioè le algori sempre, e vide non senza molestia, i tumori leggermente le gengive, e forza già per nascere la fibrinazione.

In tali circostanze feci per la prima volta, che l'ammalato avanti tre anni aveva avuto la scabbie, e coll'uso del bagno freddo del Danubio ripetuto diverse volte era la medesima in gran parte scemata, ma che però qualche volta ricompariva. Da ciò conchiusi doverli abbacchiare un'altra fiera di medicare. Pensai adunque che l'infermo alla sera prendesse uno scrupolo di sicc

di

(*) Ric. Radice di barbona

" " ginseng

" " Lapide rosso ad ana ana

" " Polipodio comun. drac.

Tagliat. in finissima polvere in 2 q. di acqua
per usar con la soluzione di Nitro quante
se ne dar ad uso.

di rosso, con due grani di cenfura ridotti in polvere, soprabbevando un infuso tepido di fiori di samburo, che alla mattina poi inghiottisse tre delle sopradette pillole.

Nel terzo giorno appena che si dava la polvere si videro qua e là delle pustole occupare la superficie della cute, comparire nelle ideori la macchia di maggior qualità, e deparsi le medesime, non meno che far sperare una futura guarigione.

Convinto di già, che l'ossistenza di queste ulcere dipendeva unicamente dalla natura scabbie, e che l'efficacia de' rimedj si era già provenuta dalla cattiva unione delle due acrimonie, presi la cosa in seria considerazione, e mi applicai a costringere la massa degli umori costretti per così fare del tutto, se fosse possibile, l'evacuazione. A questo scopo, oltre i medicamenti interni indicati di sopra, consigliai un bagno tepido, in cui l'ammalato ogni giorno doveva rimanere un ora.

Con questo metodo ottenni, che la scabbie si portasse in maggior copia alla superficie della cute, e in tale stato, alzata di più la medesima, si giugasse al principio di Settembre la vera risoluzione. Dal momento ch'esso cessò di prendere le polveri di sopra descritte non gli diedi alcun rimedio antiscabbioso, nè adoperai alcun altro medicamento di sorta alcuna. Verso i die-

dici di detto mese abbandonò le polveri; scomparve la scabbia, e si curò rifatto perfettamente dalla Spedale.

† 14.

Osservazione II.

Ecco un secondo caso simile al primo: Michele Rossi soldato d'infanteria entrò al due d'agosto dell' 1786 nel nostro Spedale con delle ulcere al petto, ed un bubone inguinale.

Fatta l'incisione a tempo opportuno del bubone, gli si davano i soliti rimedi antilinfatici.

Continuata la stessa maniera di medicina per lo spazio di tre settimane non vedendo alcun vantaggio, e al contrario rimanendo le ulcere fozzide, sospettosi, che la malattia riconoscesse altra cagione, quindi colla maggior diligenza esaminai il decorso di vita dell' ammalato.

Mi raccontò adunque di aver avuta la scabbia due volte, la prima avanti due anni, e la seconda da sette mesi, che quella fu curata nello Spedale di Neustadt, destinato per una piccola compagnia di soldati (detto Sattaggen-Spedale) e l'ultima apparve nel ritorno, che fece poco tempo fa dai Paesi Bassi. Non potendosi somministrare ai soldati, che fanno lunghi viaggi, i rimedi con quella esattezza, e circospezione, che si osservano negli spedali; non essendo stato il nostro la-

ter-

ferme trasportato in alcuni d'essi, non esigendole la scabbie ne per la quantità, ne per altro pericolo, può essere facilmente accordato, che siano venuti gli armeni della scabbie somministrati agli armeni, i quali comunicando in adde la malignità all'aria velenosa accumulata di fresco (la qual malattia per altro è facile a guarirsi mediante i conosciuti rimedi) resero il morbo lungo e ribelle.

Si aggiunga, acciò non diti luogo ad alcun dubbio, che avendo eliminato il corpo dell'infermo, trovai ancora in diversi luoghi i segni d'una scabbie inveterata. Scoperta adunque la complicazione diedi all'ammalato, come già notai nella prima osservazione, le polveri, e insieme prescissi le pillole.

Osservammo pertanto nascere dall'uso delle polveri un fastidio abbondante, e forte: la scabbie, la quale compariva alla cute in croste isolate, ma in gran numero, e che diventava subito secca. Fattanto le ulcere si liberavano dalle impurità, dovea una marcia lodevole, e in breve spazio di tempo si contrassavano. E in quella guisa, non interrotto l'uso delle polveri, poco dopo scomparì la scabbie, e l'ammalato alla fine di Settembre, recuperata la salute, fu rimandato al Reggimento.

§ 12.

Osservazione III.

Tamasso Syreck soldato di Cavalleria del Reggimento *Principe Lobkowitz* attaccato dalla febbre fu accettato nello Spedale il giorno 3. di Luglio dell' 1786. Appena accolto alla misura dovette per sua mala sorte dormire in un letto comune vicino ad un spagnofo, e ciò per tre anni continui (cosa veramente degna di meraviglia), senza che mai comparisse in questo tempo il menomo segno di febbre. Finalmente avanti due settimane per la prima volta si manifestò il suo ora celato contagio. Inoltre per quanto mi fu lecito sapere dall' alone, l'ammalato nel tempo di sua vita non ebbe altro a soffrire che nel principio del suo servizio militare avanti tre anni una febbre intermittente. Da quanto disse conghietturai esser ella stata della classe delle anomale; lungo tempo per altro durò, ma appena venne egli allo Spedale, che sotto l'uso degli insistenti sudoriferi con tale facilità, che dopo brevissimo tempo fece ritorno alla Compagnia; ma egualmente presto riacquisì forse la malattia, e riacalò, onde l'ammalato ansioso, accorgendosi un giorno venir il parossismo, bevve una mezza libbra d'aceto mischiato con una libbra d'acqua. Insorto indi un forte sudore la febbre terminò, se mai più la afflisse. Questa è la storia.

Ve-

Venuto l'inferno al nostro Spedale, sull'istante adoperai il consueto metodo contro la scabbie dall'elene posato con accuratezza sopra una parafina, e alcune ulcere al prepuzio, onde ordinai che fosse trachento alla stanza destinata per i venerei, acciò quella venisse trattata coi salini rimedi anti-venerei, cioè: Oltre al decesso beduaglio depurato si danno le nostre pillole antilittiche che al numero di quattro mattina e sera; alle ulcere si applica l'unguento balsamico col precipitato rosso tridichato come sopra. Questa fu la cura tenuta fino al v. i. d'agosto.

In questo frattempo si disperse la scabbie, ma le ulcere del prepuzio resti più impast occupavano di giorno in giorno maggiore spazio, per cui fu aumentata la dose delle cinque pillole alla mattina, e altrettante la sera. Ma neppure questo metodo, che durò fino al x. i. dello stesso mese aveva prodotto alcun buon effetto.

Cangiato ora consiglio prescritti nel x. v. giorno un purgante. Nel x. v. feci prendere alla mattina tre delle sopracennate pillole, alla sera poi una polvere composta d'una scrupolo di fiori di zolfo, e due grani di canfora, a cui dovevasi sopraaddever l'infuso di fiori di Sarraceno, facitre l'ammalato avere a ritenere alla mattina in un bagno tiepido per lo spazio d'un ora.

Con

Con questi rimedi fu di nuovo dimen-
ta la scabbie; l'aspetto delle ulcere corregge-
vansi; anzi ella gustava una storta lode-
vole. In tal modo alla fine ottenne la gua-
rigione, e per mezzo dell'acqua d'orta se-
ra (*) la perfetta consolidazione. L'ama-
lora totalmente guarita ritornò il dì 10. Set-
tembre alla Compagnia.

§. 16.

Observation IV.

Gio. Arant soldato d'Infanteria al
reg. di Meggio dell' 1786 portosi al nostro
Spedale con alcune ulcere veneree al propo-
sito. Gli aranti due anni egli dovette stare
per cinque mesi nello Spedale militare (in
allora a Gumpendorf) a cagione di alcuni
lubani venerei così ulcerati, che ad ora di
aver messo in pratica il miglior metodo, non
fu possibile impedire la guarigione. Eccezza-
ta questa infermità, egli fu sempre sano.

Incominciò la cura con un bolo pur-
gante preparato con due scampoli di radice
di guaioppa, e sei grani di mercurio dolce,
e ordinai, che ogni giorno prendesse tre del-
le nostre pillole mercuriali con un abbon-
dante.

(*) Dr. Mercurio Salis Breysii. Dose
di scrupolo in una bibita d'acqua di Calce pre-
parata.
Brevi ad alia.

dante bibita di decotto depurante; di poi che si medicassero le ulcere coll' unguento di già descritto; finalmente che ogni X. o XII. giorni si ripetesse il purgato.

Questo metodo ebbe luogo per un mese intero, ma senza alcuna utilità, anzi effetto, che le ulcere si corrompevano di più diventavano più sordide, e si allargavano maggiormente; e perciò aumentata la dose delle pillole, si numero due di cinque mattina e sera.

Al finire di Giugno l'infermo lagrava d'un punto alla cute. Eliminando il corpo scopri delle pustole scabbiose, che penetravano qua e là la superficie della pelle.

Tessuto per fermo esservi anche in questo caso una complicazione di arthrodactylia acetabulæ acrimoniae, abbandonati i rimedi fin' ora dati, diedi la polvere delicata di sepea di fiori di zolfo, e Carfara da prendersi mattina e sera, e l'infuso di fiori di samburo da bevervi sepea, e finalmente il bagno tepido da ripetersi ogni giorno.

A questo metodo di cura venne in seguito una copiosa efflorescenza di sagra in gola, che si vedeva tutta la cute coperta, e tale fu l'ottimo effetto osservato nelle ulcere, che al finire di Luglio la cicatrizzazione era del tutto calcolata. Apparevero in questo tempo alcune ulcere alle gengive, le quali pressamente, e con tutta facilità si de-

po-

perano per mezzo dell' infuso di salvia aggiungendovi maci di rose.

Verso la metà d'Agosto principiando la tosse, a dilacerarsi, ed a sfogliarsi, l'ammalato aveva un dolore forte, che gli occupava la parte destra dell'osso della fronte sopra l'arco dell'orbita, e tanta era la violenza specialmente la notte di notte, che non poteva dormire né quieto, né senza agguajo. Cercando la sede del dolore trovai nel l'osso alitato in tumore, che non soffriva un forte contatto senza dolore.

Discutendo questo tumore, che tutta la massa degli umori era interamente infusa dall'aere venereo, si di cui forma si deduceva da due arii nel corpo dell'edema, come dalli di sapori, credetti opportuno far uso dell'unione mercuriale, (*) e ciò sull'istate, giacchè l'ammalato era stato antecedentemente preparato coi bagni. Dato adunque un purgante, si incominciò la frizione alla sera del giorno seguente, che fu il giorno 16. Agosto. Un di sì e l'altro no si ungeva con due dracme d'unguento mercuriale, facendo uso nel giorno intercalare del bagno. Dopo la terza frizione il dolore nella fronte cominciò a mitigare, e dopo la quinta si dissipò interamente. Vedendo le cose andare così a seconda non velli abbandonare

N 2

la

(*) L'unguento mercuriale è composto d'una oncia di mercurio; e di un'altra di grasso, e l'olio di oliva.

le frizioni avanti il giorno 17. Settembre. In tutto il tempo della cura furono fatte 18. frizioni.

La stessa maniera di medicare fece in gran parte scomparire l'antica scabbie. Non rimanendovi più segno alcuno della medesima, poterli al' ammalato di purgarli ancora il giorno 20. Settembre; finalmente dal giorno 22. fino al 26. ogni sera gli diedi un bagno composto di una mezza dramma di lauri di uiso, e di Rosh di Sampingo quanto basterà.

In questo modo si terminò la cura; si curò interamente la cute, e fu tolto ogni sospetto di far venerea, e l'ammalato il giorno 3. Ottobre fuo fu dimesso dallo Spedale.

§. 17.

Corollari.

Dalle qui addotte quattro storie evidentemente mi sembra comprovato ciò, che al principio di questa Dissertazione mi era proposto di dimostrare. Se amassi di tirare più in lungo l'espulsione, che di confermarla la verità, molte osservazioni dello stesso argomento mi farebbero conoscere di poter asserire, che la cura delle ulcere veneree in un corpo, che già nasconde un'ere scabbioso non si potrà mai condurre a felice termine col solo metodo antivenereo.

Del.

Della definizione della malattia chiamata colica non esser del pari conforme, nè alla verità, nè all'esperienza tutto ciò, che dall'istesso alla diagnosi di questa malattia complicata, cioè che quanto spesso volte è difficile, altrettanto assai necessaria. Pel difetto dei segni esterni propri a tali affetti non vi resta altra strada a prendere, che quella specialmente della ^a storia, e questa ancora produce grandissima difficoltà, e non di rado accade, che qualche volta da un solo leggerissimo segno siamo quasi condotti per mano a scoprire la verità.

Vaggo colla mè si potrebbe opporre circa al quarto, ed ultimo caso; cioè non sembra certo, ma piuttosto conforme alla ragione, che l'indole della febbre in quel tempo così abbondantemente dissociata fosse viciata. Pare che l'obbligazione in sé sia di qualche peso, ed io stesso da principio m'era indotto a credere, che questa regola avesse in parte una origine viciata.

Ma subito compresi con questo di verità, e d'aggiustatezza afferisce il Sig. Wickman, (*) che le malattie effluviatiche nel loro consistimento non compiono subito agli osservatori; e spesso volte portano avanti di sé nel loro decorso moltissime cose

N 3

com-

(*) *Wickman* sopra la febbre di Cio. *Wickman* *Notione* 1796 pag. 35.

essersi alla vera scabbie, in maniera che con facilità, e in modo del tutto sicuro si fa il passaggio dall' un male nell' altro, e in questo modo, fuori del congiungimento della forma, sembra esser' altro poterarsi che meriti particolare riflesso, quantunque si abbia per certo, che l'origine del male, l'indole dell'acromonia, e il metodo di medicare siano assai diversi.

Il Siga. Wichmann sapea, che si dia la scabbie venerea, e prova ancora con argomenti, che quella, la quale si chiama con questo nome, non deve in conto alcuna appartenere alla scabbie.

Con maggior dritto adunque la scabbie sifilitica si dovrà chiamare *efflorescentia venerea*. La ragione è, perchè ella per lo più si propaga largamente per tutto il corpo, per la faccia, e per le porte capillari, eccettuate le mani, e le dita: che la vera scabbie però, e da principio suol abbondantemente occupare, finchè per lo più il capo, come si poteva osservare nel mio infermo. Un simile esempio ancora adduce il famigerato Wichmann, (*) per mostrare, che quella regna creduta longamente venerea, guarisce non si possa co' soli mercuriali.

Inoltre abbiamo veduto, che non si possono mai curare le ulcere avanti che la scab-

(*) Leggesi Wichmann pag. 34.

scabbie non fosse stata cacciata alla superficie della cute, e non già co' mercuriali da sotto accusa, come si può osservare di sopra, ma con' medicamenti propri. Ciò deve esser d'argomento, che quella malattia scabbie formata da una causa interna, che agisce gli umori, fino ad ora s'è resistito al metodo di cura, ossia che fosse d'indole venerea, o scabbie, o composta d'ambidue. Che il fornice silitico non fosse allato per mezzo della scotta della rogna, e contemporaneamente elpso, lo comprendiamo dal tumore, che venne nell'osso della fronte duro e dolente, dimostrando cioè e la venerezza di questo male legamento diffuso, e l'andole non corrisposto da altri sintomi, fuorché dal conveniente metodo antivenereo. In tal caso il veleno silitico fosse scomparso per la cura eternamente in un colla rogna, questo sistema non mi lascia al certo sfuggito.

La scabbie adunque da me descritta non merita in conto alcuno il nome di venerea, mentre cogli ostacoli non fu possibile guarirla. Il Sign. Wachsman disse, che la vera scabbie non può mai nascere dal veleno venereo, come la vera lue non può aver mai origine dalla scabbie; pare mi sembra d'aver sufficientemente comprovato „ che la vera rogna si può combinare col „ veleno venereo, e viceversa; „ se
cre.

modo, che si possa per l'arveniente morvan
contro l'Autore alcun dubbio sopra tale af-
ferzione; per cui volentieri mi sottoscrive
alla sentenza di questo acutissimo Medico
„ che un adulto militare per l'andietro in-
„ fetto della scabbie, non debba giun-
„ nal esser reputato innocente:” a ciò so-
lo aggiugo che, se lo scabbioso, se quel-
lo, che fu una volta della regna attaccato
può esser permeante del contagio venereo.

Io generale si deve notare, che qui tra
i nostri soldati la regna è una delle malattie
le più comuni, malgrado che la cura di tut-
to ciò, che riguarda il nostro servizio, sia
delle più esatte, e ad onto ancora della po-
lice coltivata al maggior segno, pure ogni-
qual travai frequenza di pedone, che con-
veriano negli stessi alloggi (il qual incomodo
non si può certamente evitare nella via mi-
litare) si dà unta ad un tale contagio, all'
ingenerarsi cioè, ed al propagarsi. E' oer-
to ancora, e vien dimostrato col calcolo
degli ottimi Medici di campagna, posar-
re, non di rado, e nella massima parte le
voci malattie d'armata da quell'unico in-
evitabile, e quasi inevitabile principio,
giacchè tali morbi degenerano in letali Epi-
demie, e nasce poi le Epidemie non senza
somma difficoltà si possono arrestare. (*)

§. 18.

(*) Si legge il trattato del Finanze del Sign. Cav. D.
Don. Sigismondo Aramboldi tradotto in Tedesco dal
Sign.

§. 18.

Sommario dei corollarii cavati dalle osservazioni di questa dissertazione.

Premesse le quali cose, e concetto ancora, che il fomite conosciuto della malattia, nascosto nel corpo ha atto a cangiare l' infermità d' acule alla benigna, e facile a superarsi in guisa, che acquisti una natura maligna, e resti perennemente all' atto di medicare; non s'ia meravigliosa, a persona l'aver io sì decisamente asserito, che l' *ottinacità delle ulcere veneree, contratte dai soldati, debba sospingermi volte a derivare dalla scabbie celata.*

A questa asserzione si debbono aggiungere altre cose di non legger momento; specialmente se si considera, che il metodo abbracciato dal volgo per curare la scabbie è uno dei più nocivi; ne è da lodarsi certamente quello, che tengano tutt' ora alcuni pratici: si deve inoltre attribuire alla difficoltà dell' arte, che né il tempo, né i segni possano essere indicati, ma il quale, e questi, ancorchè si scinghesse l' ottimo metodo di medicare, rimanga soppresso radicalmente il seme del male, e cacciato dal corpo.

Per

*Reg. Gio. Adamo Schmidt past. Med. Vinea,
vita. Vol. II. Capit. X*

Per la qual cosa s'imo' superfluo di invitare l'attenzione dei Medici di campagna a conoscere questa verità ; imperciocchè essi stessi, la di cui scienza è appoggiata agli esperimenti, motti dalla guerra della natura non ne convengono. Ai giovani Chirurghi poi, che da principio esercitano la loro pratica, scaderà di poter cogli occhi propri osservare tutto ciò, che fa qui da me dimostrato.

All' uomo onesto, e d'animo leggero saggiamente si fa avvertire, che nelle malattie ipsoe siate erulse di poco momento si cade in alcuni incampi, quali non si possono evitare, nè coll'apparato di tutta la scienza risolvere, nè per mezzo d'altri sferzi. Principalmente però è da dolersi d'un Medico di campagna, a cui per doppio dovere d'ufficio incombe il render ragione del danno ed all' infermo, ed al Sovrano.

Per ciò che riguarda il metodo, che propoli per levare la complicazione della malattia ogn' uno vedrà esser esso molto semplice, e tratto dalla natura della della cosa. L'indicazione primaria della cura considera nel liberare gli umori dalle antiche reliquie della roga, ed evacuarli per le vie ordinarie della natura. A questo scopo eggiamente corrisponde i fumi di solfo, e la carboxa coll'infuso tepido, cacciando cioè il sangue nocivo alla superficie del corpo pri-

ma dispoſto, ſpecialmente per mezzo de' bagni caldi. Quantunque aveſſi conoſciuto eſſer molto utile permentovato l'uſo de' bagni, pure non creſetti ſempre opportuno l'amminiſtrarli. Oſſervando la cute molle e pulita, ed i vaſi caſſari ſpenti diſtintamente, preferii i medicamenti interni, come ſi può vedere nella ſeconda mia oſſervazione; pel contrario ne' caſi di cute ſecca, e ſqualida, e d'oſtruzione de' vaſi, ſi videro i bagni dotati di ſomma virtù, per cui pote la natura eſſere ſoccorſa, e le ſeade diſpoſte a portar fuori le materie acive. Spontaneamente ne riſcote pel ſuo acidoletto, che converga ordinare nel tempo ſteſſo all'ammalato un regime, che ſopra la ſtagitazione, e impediſſa tutto quello, che può contribuire a ſopprimela.

Forſe non poſo avrebbe giovalo ancora l'etiope mariale, ma non ſperimentai, che i ſuddetti rimedi eſſendo ſemplici, della cui efficacia nella rogna ritardata ebbi più volte occaſione d'avere ſelle prove.



OSSERVAZIONI

SOPRA

LA VIRTÙ ANTISPASMODICA

DELL'

I P E C A C O A N A,

NELLE CONVULSIONI DELLE GRAVIDE,

E DELLE PARTOIENTI

DEL

ING. PROF. GIUSEPPE GIACOMO FLEURY.

§ 1.

*È inefficacia di tutti i rimedi fin' ora lodati
contro di questa convulsione.*

Nel copioso numero delle malattie, che
seguono nel tempo di gravidanza, prima
del parto, e dopo esserne stesso donna, la
più terribile, e non di rado fatale sono le con-
vulsioni. Per mala sorte in dodici casi su
trentasei dell' alto indole di questa infer-
mità, e dell' inefficacia dei rimedi fin' ora
raccomandati, e sotto la mia cura, e sotto
quel-

quella ancora d' altri egregi Medici. Le sa-
vate di lingue, i clisteri, i bagni tepidi, i
cataplasmi ammollienti, la valeriana, l'assa
fetida, la canfora, il mosto, il calceuo, la
spirito di Corno di Cervo, la cortecia pe-
ruviana, l'estratto di giunquiamo, l'elci-
quari in pochissime convulsioni soltanto, e
la maggior parte leggieri, e di natura ille-
riche hanno portato qualche giovamento. Al-
cune donne ciò non ostante qualche volta si
sono sottratte dalla morte, gravandosi sotto
le convulsioni nelle d' un parto naturale, od
artificiale; perirono altre quantunque avve-
lino partorito in mezzo alle convulsioni.

§ 2.

*L'occasione avuta di scoprire la virtù di
un rimedio sicuro in questa malattia.*

Ho dato nell' anno 1740. 22 grani d'Ipe-
cacuana per scopo di eccitare il vomito ad
una donna gravida di nove mesi, molestata
dalle convulsioni, sospettando, che il venosi-
colo contrasse la biliosa. Passor tre
ore con stupore cessar le convulsioni sedate,
fatta che sopravvenisse il vomito inco-
minto al vomito. Da quel tempo in poi la
fortuna mi fu propizia in guisa, che in cin-
que altri casi mi valsi con piccola dose d'Ipe-
cacuana salvare la madre colla posta. M'era
già nota la prerogativa della medesima pre-
scritta in piccole dosi in altre malattie. Il

Dr.

Dr. *Alengale* (*) cura un sing. convulsivo, e Dr. *Micheli* (**) alcuni calcoli vesci, che non si poterono guarire coll' oppio. Il celeb. Professor *Haber* (***) usò un sico spasmotico; Il Dr. *Colombier* (****) ed *Agflow* (*****) una tosse convulsiva con piccole portate d'ipocossano, il qual rimedio per altro non eccitava vomito, o leucosia. Molto da questi fortunati incontri mi propalò di sperimentare l'indole antispasmodica dell' Ipecosano nelle convulsioni delle gravide, e delle partorienti, ne le prove furono prive di successo.

§. 3.

Un vantaggio proprio a questo rimedio.

Avendo osservato, che già aumentati nel tempo delle convulsioni erano per lo più stupidi, insensibili, non sententi a le stoffe, e finalmente che morivano asfissiaci, m' affrettai dall' oppio, ben sapendo, che questo, dato in gran dose, produce sopori, e eccitando il sangue più abbondantemente alla testa, aumentando in calore, e costringendoli il ventre

(*) *Trattato Medico* Vol. VI. Sopra l'uso dell' Ipecosano nell' asma.

(**) *Dissertationes* Sopra l'Asma polipale, alla nuova lingua. pag. 120.

(***) *Treatise de Tussis* T. II. pag. 119.

(****) *Colore della medicina siccata* T. III. pag. 22.

(*****). *Ann della Società d'Edimbo* Vol. I.

tre ragioni l'apoplezia; incomodi, che non si osservano mai talora dall' ipercarotina.

§. 4.

Le tagioni.

Acciò più chiaramente si dimostri, in quale specie di convulsioni venga particolarmente indicata l'ipercarotina, passiamo in rivista le cause delle convulsioni, che precedono, accompagnano, e seguono il parto.

§. 5.

Causa I.

Tra quelle primariamente occorre l'ipertensione la congestione del sangue alla testa. Nelle donne molto pletoriche, le quali negligeranno la febricoltura nella gravidanza, e dove l'arteria discendente viene qualche poco dall' utero molto chiosu compressa (specialmente nella prima gravidanza, in cui la periferia dell' addome non ha sofferta dilatazione alcuna) si osservano assai di frequente le convulsioni: l'ottimo rimedio per queste è la flebotomia nel piede, nel braccio, e nella gualtore, da ripetersi secondo la necessità de' sintomi. I lavateri emollienti, e insieme eccipienti, il lavamento del capo coll' acqua fredda, l'allentamento d'ogni rimedio calidificante, e stimolante, e se è possibile, la promozione del parto giovanee (m).

moltissimo. Se le convulsioni ciò non cessano continuano, si può subire all' uso dell' Ipecacoea.

§ 6.

Causa II.

L'emorragia grande d'utero forma la seconda cagione. Le convulsioni in allora sono per lo più fatali. Si deve preferire oltre l'Ipecacoea, la Tistura di Cloruro di zinco dolce; si deggiasi applicare alla regione ipogastrica, e lombare i bagni freddi, si deve otturare colle spongie, o colle lancia la vagina dell' utero; si può dare ogni quattro ore del brodo di carne colla gelatina di Carne di Cervo, del latte col tuorlo d'oro, ed un'emulsione mandolata etc. Baylisio di già (nelle sue Opere pag. 109.), e dopo di lui molti Medici Suedesi hanno lodato l'Ipecacoea da ripetersi in poca dose, come un rimedio infallibile nel flusso di sangue dell' utero: io per altro l'ho trovata soltanto efficace in quella specie d'emorragia, la quale nasce dallo spasma, ne uodo, che il flusso di sangue venga tolto per mezzo della virtù astringente dell' Ipecacoea, imperocchè pochi grani di questa radice esaltano spesse volte l'emorragia; ma sembrami piuttosto provenire dalla stimolo dei nervi del ventricolo, i quali fanno cessare per confuso le con-

convulsioni nelle altre parti come fece avvertire il celeb. Sig. Meyer. (*)

§. 7.
Causa III.

L'eccessiva iritabilità del sistema nervoso si può contare come una terza cagione. Il dolore sempre più forte sotto il parto, l'ira, il terrore, la difficoltà di partorire, costano in quelle donne le convulsioni. Ho veduto un' Ostetricante, la quale in quattro successivi parti ogni qualvolta le sopravvenivano i dolori di parto, era assalita dalle convulsioni, le quali non cessavano, finchè la bocca dell' utero non si fosse interamente aperta, e le acque non avessero avuto il loro corso. La diedi nel quinto parto una piccola dose d'oppio; corra più presto, che fosse possibile le acque, e le convulsioni cedettero. In questa classe richiama del pari le convulsioni isteriche non molto pericolose, facili a domarsi per mezzo del castoreo, dell' assafetida, della camphora, ed altri rimedi antispasmodici.

§. 8.
Causa IV.

La *stipura biliosa nel ventricolo* non di rado coglie talie gravide, e talie partorite.

(*) Sopra l'ordine etc. dell' Iperemene, e di alcuni altri Emptori dati, la plecola delle pag. 17.

tormentile convulsioni. L'emetico in questo caso fa la vece d'ogni antispasmodico, e specialmente l'ipocacoato, mentre con essi si eliminano le materie biliose.

§ 9.

Causa 4^a.

Alla quinta causa di queste convulsioni mi sembra appartenere la ritenzione *prodotta dall'orina*. Nasce per tre modi la soppressione dell'orina, nuda dalla retroflessione dell'utero, la cui si di lui fondo si appoggia all'utero retro, e la bocca della vagina orinaria al di lui collo in guisa, che è di ostacolo allo scarico delle feci, e dell'orina. Nell'ultimo mese di gravidanza potrà del pari nascere l'istessa prodotta dall'utero appoggiato obliquamente alle ossa del pube, e dell'utero, e dal capo del feto, che comprime l'utero. La cura delle convulsioni causata dall'utero, e dall'altra di queste cause dovrà consistere nel ridurre al luogo naturale l'utero; si dovrà rimuovere dalle ossa del pube, la testa del feto situata obliquamente; e alla fine si applicherà il catetere. Trascurate queste avvertenze Chirurgiche, se l'oppio, se l'ipocacoato possono essere giovevoli.

§ 10.

§ 10.

Causa VI

Le convulsioni, che accompagnano il compimento dell'utero quasi sempre hanno un efeto fatale, accendè coll'oppio vengano sopite.

§ 11.

Causa VII

L'improvvisa soppressione de' lochy deve ancora essere annoverata tra le cause delle convulsioni. Quando i lochy tutto ad un tratto si sopprimono per lo spavento, l'ira etc. (eccettuato il freddo), le non viene in seguito il tetano, sopravvengono però generalmente le convulsioni. In questo caso si devono fare sull'illante alcune cavate di sangue nel piede, porre la puerpera in un bagno, ed applicare dei cataplasmi ammollienti all'addome. Per mezzo poi d'un tubo si faccia uso dei vapori di acqua calda all'utero, dando internamente l'*Speacuosum* con del Croco, Aloe, e Nitra. Con tal metodo ricapera una donna tormentata da quella specie di convulsione.

O 2

§ 12

§. 12.

Capitolo VIII.

1. Credo che la *metastasi del latte* debba-
si considerare come l'ultima delle cagioni
conosciute, che danno orla alle convulsioni.
Se il latte, passati i primi otto giorni del
parto, scappa improvvisamente dalle
mamme, e segna le convulsioni, l'in-
dicazione principale sarà di fare una deriva-
zione del latte di nuovo dal cervello alle
mamme, o agli intestini, o finalmente per
mezzo dei lochi. L'evacuazione delle mam-
melle per mezzo della tetta del latte, i
fomenti applicati alle mammelle, ed all'ad-
dome; la cavità di sangue nel piede, il
bagno tepido, e ciò che vien principalmen-
te lodato nelle *metastasi del latte*, cioè l'or-
cane applicato in gran dose, potrebbero ap-
portare un gran vantaggio. Trovò in un ca-
so del pari molto efficace il *nitro confecta-
to*. Oltre a questi rimedi si deve mettersi in
uso l'*Apocynum*.

§. 13.

Capitolo IX.

Si aggiunga finalmente alle suddette
cause anche la *piressia provocata dai nervi*,
di cui noi parliamo. . Spellano le den-

na verso il fine della gravidanza, e durante il parto soffriva delle convulsioni (*) senza che si potesse sospettare alcuna delle otto sopranominate cause. Io per altro ho fatto sempre ricorre all' *Ipericozana*, e come si può vedere dalle seguenti istorie, l'olio corrispose perfettamente all'aspettazione.

§. 14.

Osservazione I.

Fui chiamato nel giorno xxv di Luglio dell' anno 1780 da una donna grvida nel nono mese, madre già di due figli, affetta da forti convulsioni, e priva del tutto de' sensi. Il parossismo ritornava due volte ogni quarto d'ora, e nel tempo intercalare l'ammalata non era presente a se stessa. Dalla bocca non usciva alcuna spuma. Mi fu riferito, che da alcuni giorni leggevasi la medesima d' inappetenza, di qualche dolor di capo, ed era senza sonno. Aveva la faccia alquanto rossa, un poco gonfia, e la lingua verso la radice coperta d'immensitate. Asferirono alcuni degli allanti, che le convul-

60

(*) Sono simili anche quelle, che sopravvengono subito dopo il parto, e ad alcune un convulsione che non nella difesa A. E. R., l'ammalata *Amalancha* Risale in

Non ammazzerano sull'istante l'achena. Trovavi la bocca dell' uovo ancora brevemente chiusa, nè offrevai, che il ventre sotto le convulsioni, e dopo di esse si fosse contratto. Non avendo in alcun caso potuto scoprire alcuna delle molte cause, che producono le convulsioni nelle donne pregnanti, mi cadde in sospetto, che la savana biliosa risiedendo nel ventricolo, e nel duodeno non avrebbe, per consenso del regni del ventricolo col cervello, formata una congestione di sangue alla testa, e quindi seguita una specie di convulsione.

Sull'istante cessai una cavata di sangue nel braccio, e feci applicare ogni ora un clistere emolliente fatto d'infusione di foglie di fenice; di poi diedi uno scropolo d'*Ipecacuenana* macinata col Zucchero allo scopo di farla vomitare; il che accade senza grande fatica, mentre appena che le fu offerta la polvere, la cavità di nuovo per metà. Osservate le quali cose preferii, che ogni quarto d'ora le si desse una polvere scropola di un grano d'*Ipecacuenana*, e cinque di Zucchero. Questa le veniva data in un cucchiajo, premendole di facciata nel fondo della lingua; provando, che questa malattia nelle donne seguita per lo più era fatale, e pressochè di ritorno fra breve. Passò tre ore valde le convulsioni moderate in guisa, che gli istinti d'essere nel se molto for-

doggi, né lunghi, come osservai nella prima visita; l'ammalata nell'accesso del vomito nella rigetto; e per soffocò non riuscì, che il lavativo. Ristando la bocca dell'utero tutt'ora chiusa, ordinai, che si ripetesse l'ipocrocozo.

Dopo tre altre ore visitando l'inferma ebbi la consolazione di vederla senza convulsione; ora per altro molto debole, e sonnolenta, ma con mente sana. Continuai per tre ore l'uso della Ipecacuoza, e prescrissi anche una soluzione di nuxoma col succo di Giambiro. Le due frangie di corpo, che restarono in seguito furono naturali, e non biliosa. Nell'unico accesso di vomito, che soffrì l'ammalata vomitò un poco di maco con della polvere grigia, e per otto giorni ella trovossi molto bene. Il parto poi felice di una bella figliuola vi diede l'ultima mano.

Non vedendo in questo caso, che l'Ipecacuoza aveva potuto avocare per mezzo del vomito, o del soffocò la bile creata, e le altre immondizie, mi sembrava, che l'Ipecacuoza avesse qui agito colla sola sua virtù antispasmodica.

§ 15.

Osservazione II.

Una ragazza di 19 anni gravida per la prima volta nel nono mese, di costituzione di corpo perfettamente sana, divenne

gestaccolata a cagione della foga improvvisa del soggetto, ch'ella amava teneramente. Passando la notte in questo sì sospir, ed alle lagrime, alle due ore venne sorpresa da convulsioni con privazione di mente. Accorsevi il Medico prescribba una soluzione d'oppio nell'acqua di melissa colle spirito di Corno di Cervo da dosargliene ad ogni mezz' ora, un cucchiajo, di poi due lavativi, ed una tazza di sangue. Alle sette di mattina venni io soprachiamato, e dalla relazione degli assistenti appresi, che le convulsioni non avevano punto ubbidito agli accennati rimedi. La bocca dell' utero era alquanto aperta, il liquor dell' amnio si distingueva chiaramente al tatto in forma di piccola vesicula. Ordinai adunque nel momento la quarta parte d' un grano d' Ipecacoana trita con cinque grani di zucchero da far inghiottire ogni quattro d' ore all' ammalata; del resto diti di lasciar ogni cosa alla natura. Dopo tre ore ritornando, offeresi le convulsioni molto più leggere: non venne però in seguito nè vomito, nè scioglimento di corpo. Continuò l' Ipecacoana unitamente ai dotti anallattici. Passò tre ore non si vedevano più convulsioni, e dopo altre sei seguì il parto. In questo caso di nuovo mi sembra, che l' Ipecacoana abbia operato come diretto antispasmodico.

Osservazione III.

Venne senza alcuna manifesta ragione verso le ore nove di sera attaccata dalle convulsioni un'altra Giovane di 18 anni nel nono mese di gravidanza. Fui chiamato a consiglio col Sign. Prof. Stedele due ore dopo, ove mi venne detto d'essere stata fatta all' inferna una cavata di sangue, d'aver ella preso una misura di laudato Spasmo del Siderone coll' essenza di Capivaro, distilla di Santalo, e Aquar di Corvo di Corvo. Proposi, che ogni quarto d'ora le fosse data una quarta parte d'un grana d'Ipocacoana col Zuccaro; e avendo inteso esser di corpo ossuta, e aver ella mangiato molto, e con appetito non cedevano, preferii un lavativo come pollo del decocto d'Ipocacoana col sale tartaro. Passata men' ora scabri qualche urto di vomito, rigetto qualche parte di quanto aveva mangiato, ed ebbe abbondanti scariche di corpo: verso l'aurea collorone interamente le convulsioni. Dopo otto giorni gravosi del parto assai felicemente. Osservando il celeb. Sig. Stedele gli ottimi effetti in questo caso dell'Ipocacoana, me promisi all'occasione di ripetere l'esperimento. Insinuai quindiamente mi somministrò le seguenti due Idree.

pe di tameriadi, e nitro. Per tutta la notte tutte l'indurta soporosa; le convulsioni per altro cessarono interamente. Passate le ore xii del giorno xvii cominciò l'inferma a ritirarsi di nuovo ai suoi. A ragione poi del polso duro, e pieno le furono dettate ix once di sangue, e venne applicato al ventre dolente al costato un leggerissimo cataplasma ammolliente. In questo tempo le si dava l'ipocacoema soltanto ogni due ore. La febbricitazione di mattina operò per lo stesso da quindici volte. Nel giorno xviii di mattina era pulsante a la folla; i lochi fluivano regolarmente, e l'addome soffriva il costato. Il decotto ammolliente si continuava, e si ingloba collata un emulsione nitrosa. Agli xix si trovava meglio; la testa era più libera, e l'appetito ritornato. Nel xix giorno soppravvenne la febbre latta alla testa. Si faceva uso della bevanda ammolliente, e dell'emulsione come ieri. Nel xxi il latte scorreva in compagnia de' lochi. Nel xxii stava la puerpera molto bene. Si prese in pratica il solo decotto ammolliente. A motivo poi dell'amarezza, di cui languiva nel xxiii giorno, le fu prescritta la nuova ricetta del decotto di radici di graminia, aggiungendovisi un poco di sale di Glauber, e sciroppo di cedro. Nel xxiv, e xxv, procedute alcune scariche, le cose andavano sempre più a seconda. Continua.

ta la bevanda emolliente non si adottò altro rimedio. Al 17 di febbrajo, rimasta perfettamente, abbandonò la Scuola Chirurgico-Pratica.

§ 13.

Observation V.

Al xxi di Novembre dell' 1786, una ragazza di 19 anni venne tormentata dalle sciagure della mestrua fino alle due del dopo pranzo da continui dolori di parto. Tutte le acque, senza che fosse preceduta cagione alcuna, fu sorpresa da tali convulsioni, che appena si poteva trattenere da lei affatti. Immediatamente le fecero odorare dello spirito di Corno di Cervo, ed internamente le fu ordinata una mistura composta di *Elixire di Castoreo*, *Laudano liquido*, *acque di camomilla*, *menta*, e *sciroppo di menta*; ma le convulsioni si rivedevano che non cessate sempre più tosti, ritornando da sette volte fino alle tre del dopo pranzo. Fatta la cavata di sangue, le fu dato ogni quarto d'ora un mezzo grasso d'*Ipocacoa* con tre grani di Zucchero. Passate le otto e mezzo di sera, stando da qualche tempo la testa del feto sopra la base del cranio per uscire dalla pelvi, venne senza difficoltà vivo, ed il feto affretto coll'ajuto del forceps. Le secondarie sortirono spontaneamente dopo mezz'ora. Benchè il feto fosse di già venuto alla luce; le

le convulsioni per altre replicarono da quattro volte fino alle ore dodici di notte, e la puerpera rimase soporosa. Internamente le fu data della manna col succo di Glasbeo, e col decotto di radice di graminia; le furono applicati dei clisteri ammollienti, e al venire dei cataplasmi della medesima natura. Ai XXI: l'ammalata non era ancora del tutto presente a se stessa, e le convulsioni si la tormentarono da quattro volte, ciascuna delle quali per altre decolorava di forze. Il flusso de' lochi s'era soppresso; l'edema d'uno nel destro lato, resistente al contatto; il polso pieno, celere e duro: avanti pranzo le furono dettate del piede dieci once di sangue, e al dopo pranzo lei dal braccio; di poi fu applicato un lavativo. Si continuò a poche dell'uso dell'ipercacca. Ai XXII: giacque soporosa, libera però dalle convulsioni: il polso più molle, più lento, il dolore minora. S'abbandonò l'ipercacca, e si ritornò unicamente la mattina di manna col decotto ammolliente. Ai XXIV le evacuazioni furono copiose, ed alla sedici. Ai XXV l'inferma aveva la mente alquanto più ferma. Nel XXVI, e XXVII era perfettamente a se; i sintomi s'erano fatti più leggeri; le forze conservano di giorno in giorno sempre più. Alla fine poi nel XXVIII giorno di Dicembre, essendo la infera fu liberata dalla scomoda Scuola.

Gi.

Oltre i casi summentovati il celeb. Sig. Stahly Professore di Chirurgia nell' Università di Pech risulò cinque grande aneurisma dalle convulsioni coll' uso dell' *Spontoporus* secondo il mio avviso.

Crederei d'aver acquistata una bellissima mercede, se molte menti succedero uso di questo rimedio da me scoperto contro le convulsioni d'istronde in massima parte fatali; imperocchè così si conserverebbero varie famiglie, e potrei unico si avventurasse scoperta a quell' altra, che ottenni dalla *Tintura di Cassia* nel *coraggio d'aceto*, la quale mi arreb' estremo piacere, giacchè da quel tempo a questa parte una gran quantità di donne la somministra alla morte.

AVVISO.

Il cortese lettore ha già dall' antecedente Dedicazione quanto può servire di Prefazione alla Traduzione che gli presenta.

All' uede solo quel in accento di far osservare che il costo dell' edizione Originale potendo essere un ostacolo al divulgarsi moltiplicata d' Esemplari, il pubblicare una Traduzione a prezzo assai più vile non potea che riuscire grato, ed opportuno a spargere per molte più mani le interessanti scoperte de' Christiani Autori. Essi troverà un passato degno della propria tradizione, ed io mi feliciterò d' avergliene facilitato il mezzo.

L'Editore.

INDICE.

I. DICERTAZIONE Sopra il Fungo dell'ardimento del ginocchio, pag. 1.

II. DICERTAZIONE Sopra la Colica Serena pag. 85.

III. DICERTAZIONE Sopra l'Anurismo vesicoe pag. 122.

IV. DICERTAZIONE Sopra l'ufficio del detente della Cornuta verde delle nati nel trattare le ulcere pag. 147.

V. DICERTAZIONE Sopra l'esistenza dell'ulceri vesicoe complicate coll'acromia scabbiosa pag. 275.

VI. DICERTAZIONE Sopra la virtù antispasmodica dell'Ipecacuanha nelle contrattioni della gravida, e delle partorienti pag. 304.





403.



